

Введение. Тромбоциты играют центральную роль в функционировании свертывающего звена системы гемостаза. На сегодняшний день одними из самых распространенных заболеваний во всем мире являются изменения, связанные с нарушением работы сердечно-сосудистой системы и системы крови. Понимание онтогенетического развития тромбоцитов дает возможность прогнозировать и корректировать возможное развитие заболевания, связанное с повышенной активностью свертывающей системы. Цель исследования: изучить динамику тромбоцитарных показателей в различных возрастных периодах.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование. У 362 больных с психическими отклонениями в возрасте от 12 до 90 лет определяли следующие показатели: количество тромбоцитов (platelets, PLT), средний объем тромбоцитов (mean platelets volume, MPV), относительную ширину распределения тромбоцитов по объему (platelet distribution width, PDW), тромбоцит (platelet crit, PCT). Для анализа результатов выделяли следующие возрастные периоды: подростковый, юношеский, первый зрелый, второй зрелый, пожилой и старческий.

Результаты. У женщин с психическими заболеваниями в период 16-36 лет количество тромбоцитов (PLT) значимо выше ($p < 0,05$), чем у больных мужчин, что может быть связано с естественными физиологическими процессами, опосредованными гормональными изменениями. Разница в значениях PLT в первом зрелом возрасте между мужчинами и женщинами осуществляется за счет тромбоцитоза, в более старших возрастах - за счет сочетания тромбоцитоза и тромбоцитопении, что приводит к повышенной встречаемости в этом возрасте тромботических заболеваний. У больных с психическими заболеваниями обоих полов наблюдалось общее снижение с возрастом значений MPV, PCT, PLT ниже референтных. Значимая отрицательная корреляционная взаимосвязь между значениями PLT-PDW, PLT-MPV, PCT-PDW в первом взрослом, втором взрослом и пожилом возрастах свидетельствует о гиперфункции компенсаторных механизмов, сдерживающих участие макротромбоцитов в процессе свертывания. В свою очередь, высоко значимая средняя положительная корреляция между значениями PCT-MPV ($r = 0,69$; $p < 0,001$) в старческом возрасте указывает на действительную роль крупных фракций тромбоцитов в формировании тромботических осложнений.

Заключение. В младших возрастах (подростковый, юношеский) обнаруживаемые изменения были ассоциированы с полом пациента, что может быть связано с влиянием половых гормонов на развитие и функцию тромбоцитов. В старших возрастах (второй зрелый, пожилой, старческий) была обнаружена динамика индексов, свидетельствующая об участии в

процессе гемостаза преимущественно макротромбоцитов, ассоциированных с высоким риском развития тромботических осложнений.

Introduction. Platelets play a crucial role in the coagulation system. Globally, disorders associated with impaired cardiovascular and blood systems are one of the most common nowadays. Understanding the ontogeny of platelets allows predicting and managing a possible disease associated with increased activity of the coagulation system.

Aim: to study the dynamics of platelet parameters across different ages.

Materials and Methods. A retrospective study was carried out to determine platelet parameters in 362 patients with mental disorders aged 12 to 90 years, i. e. platelet count (PLT), mean platelet volume (MPV), platelet distribution width (PDW), and thrombocrit (platelet crit, PCT). To analyze the results, the following age periods were distinguished: puberty, adolescence, early, middle-to-late adulthood, early old and middle old age.

Results. In women with mental illness aged 16-36 years, the platelet count (PLT) is significantly higher ($p < 0.05$) than in affected men, which may be due to natural physiological processes mediated by hormonal changes. The sex-related difference in PLT values during the early adulthood is due to thrombocytosis, at older ages - due to a combination of thrombocytosis, and thrombocytopenia yields an increased incidence of thrombotic disorders. With age patients with mental illness, both male and female, demonstrated a general decrease in MPV, PCT, PLT values below the reference. A significant negative correlation between the values of PLT-PDW, PLT-MPV, PCT-PDW in the early, middle-to-late adulthood and old age indicates hyperfunction of compensatory mechanisms that prevent macroplatelets from participating in the clotting process. In turn, a highly significant mean positive correlation between PCT-MPV values ($r = 0.69$; $p < 0.001$) in middle old age is indicative of a real role of large platelet fractions in the thrombotic complications.

Conclusion. At younger ages (puberty, adolescence), the observed changes were gender-related, which may be caused by the effect of sex hormones on the development and function of platelets. At older ages (middle-to-late adulthood, early old and middle old ages), we found the dynamics of the indices suggesting that hemostasis involved mainly macroplatelets associated with a high risk of thrombotic complications.