

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет вычислительной техники

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине «Математический анализ»
на тему: «Несобственные двойные интегралы»

Выполнила: студентка 2 курса,
группы 13ФМ1
Арефьева Т.А.

Руководитель:
доцент Куприянова С.Н.

Пенза 2015

Содержание

§1. Несобственные двойные интегралы.....	3
1. Интегралы, распространенные на неограниченную область.....	3
2. Теорема от абсолютной сходимости несобственного двойного интеграла..	6
Список литературы.....	9

§1. Несобственные двойные интегралы.

1. Интегралы, распространенные на неограниченную область.

Понятие двойного интеграла обобщается на случай неограниченной, т.е. простирающейся в бесконечность области, или на случай неограниченной функции, подобно тому как это сделано в главе тринадцатой по отношению к простым интегралам.

Остановимся сначала на случае неограниченной области (P) .

Примером такой области может служить вся плоскость или часть её, лежащая вне некоторого круга или другой ограниченной плоской фигуры, какой-либо угол и т.п. Что касается границы этой области, то она предполагается имеющей площадь 0 (например, состоящей из кусочно-гладких кривых) в каждой ограниченной своей части. Пусть в области (P) задана некоторая функция $f(x, y)$, которую будем предполагать интегрируемой в обычном смысле слова в каждой ограниченной и квадратируемой части области (P) .

Проведя вспомогательную кривую (K') (тоже с площадью 0), осечем от области (P) ограниченную и связную её часть (P') , в которой интеграл

$$\iint_{(P')} f(x, y) dx dy \quad (1)$$

по предложению существует. Станем теперь удалять кривую (K) всеми её точками в бесконечность, так, чтобы наименьшее расстояние R от начала до точек этой кривой возрастало до бесконечности. Тогда отсекаемая ею переменная область (P') постепенно будет охватывать все точки области (P) : каждая точка из (P) будет принадлежать (P') при достаточно большом R .

Предел (конечный или бесконечный) интеграла (1) при $R \rightarrow \infty$ называют (несобственным) интегралом от функции $f(x, y)$ в неограниченной области (P) и обозначается символом

$$\iint_{(P)} f(x, y) dx dy = \lim_{R \rightarrow \infty} \iint_{(P')} f(x, y) dx dy \quad (2)$$

В случае существования конечного предела интеграл (2) называется *сходящимся*, в противном случае - *расходящимся*. Функция, для которого интеграл (2) сходится, называется *интегрируемой* (в несобственном смысле) в области (P).

В случае положительной функции $f(x, y)$ достаточно рассмотреть какую-нибудь определенную последовательность удаляющихся в бесконечность кривых

$$K_1, K_2, \dots, K_n, \dots$$

и отсекаемых ими областей

$$P_1, P_2, \dots, P_n, \dots,$$

Предположить существование конечной границы

$$I = \sup_n \left\{ \iint_{(P_n)} f(x, y) dx dy \right\},$$

чтобы отсюда уже вытекала сходимость интеграла (2).

Действительно, какую бы область (P') ни отделить кривой (K') от (P'), при достаточно большом n эта область целиком будет содержать в (P_n), так что

$$\iint_{(P')} f(x, y) dx dy \leq \iint_{(P_n)} f(x, y) dx dy$$

И, тем более

$$\iint_{(P')} f(x, y) dx dy \leq I. \quad (3)$$

С Другой стороны, по заданному $\varepsilon > 0$ можно найти такое n_0 , чтобы было

$$\iint_{(P_{n_0})} f(x, y) dx dy > I - \varepsilon.$$

При достаточно большом R^* , в свою очередь, область (P') охватит (P_{n_0}) следовательно, и подавно

$$\iint_{(P')} f(x, y) dx dy \leq I - \partial. \quad (4)$$

Неравенства (3) и (4) в совокупности доказывают, что число I удовлетворяет определению двойного интеграла.

С помощью этого соображения легко доказывается теорема о сравнении интегралов. Далее, если сохранить относительно функции $f(x, y)$ прежнее предположения, то *из сходимости интеграла от $|f(x, y)|$, распространенного на неограниченную область (P) , вытекает сходимость подобного же интеграла для функции $f(x, y)$.*

Для доказательства этого рассмотрим две неотрицательные функции:

$$f_+(x, y) = \frac{|f(x, y)| + f(x, y)}{2}, f_-(x, y) = \frac{|f(x, y)| - f(x, y)}{2};$$

очевидно,

$$f_+(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & \text{если } f(x, y) \geq 0, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

$$f_-(x, y) = \begin{cases} -f(x, y), & \text{если } f(x, y) \leq 0, \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Из интегрируемости функции $|f(x, y)|$ вытекает сходимость интегралов для функции

$$f_+(x, y) \leq |f(x, y)| \text{ и } f_-(x, y) \leq |f(x, y)|,$$

а следовательно, и для функции

$$f(x, y) = f_+(x, y) - f_-(x, y).$$

Весьма замечателен тот факт, что и обратно: *из сходимости интеграла от функции $f(x, y)$, распространенного на неограниченную область (P) , вытекает сходимость интеграла и для $|f(x, y)|$.* Этому предложению нет аналога в теории простых несобственных интегралов: мы знаем, что там могли существовать и не абсолютно сходящиеся интегралы.

Доказательство мы дадим в следующем n^0 .

2. Теорема от абсолютной сходимости несобственного двойного интеграла.

Каждый сходящийся интеграл

$$\iint_{(P)} f(x, y) dx dy. \quad (5)$$

необходимо и абсолютно сходится, т.е. одновременно с ним сходится и интеграл

$$\iint_{(P)} |f(x, y)| dx dy. \quad (6)$$

Допустим противное. Взяв последовательность областей $\{(P_n)\}$, так, чтобы они, расширяясь, постепенно охватывали всю область (P) , будем иметь

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{(P_n)} |f(x, y)| dx dy = +\infty.$$

Не умаляя общность, мы можем допустить, что при каждом значении n выполняется неравенство

$$\iint_{(P_{n+1})} |f(x, y)| dx dy > 3 \iint_{(P_n)} |f(x, y)| dx dy + 2n.$$

Этого можно достигнуть, разрезая (в случае надобности) последовательность $\{(P_n)\}$, т.е. извлекая из неё частичную последовательность и заново нумеруя её.

Обозначая через (p_n) разность областей (P_{n+1}) и (P_n) , очевидно, будем иметь

$$\iint_{(p_n)} |f(x, y)| dx dy > 2 \iint_{(P_n)} |f(x, y)| dx dy + 2n.$$

Но

$$|f(x, y)| = f_+(x, y) + f_-(x, y),$$

так что

$$\iint_{(p_n)} |f(x, y)| dx dy = \iint_{(p_n)} f_+(x, y) dx dy + \iint_{(p_n)} f_-(x, y) dx dy.$$

Пусть из двух интегралов справа большими будет, например, первый.

Тогда

$$\iint_{(p_n)} f_+(x, y) dx dy \geq \iint_{(p_n)} |f(x, y)| dx dy + n.$$

Заменяя двойной интеграл слева достаточно близкой к нему нижней суммой Дарбу, сохраним неравенство

$$\sum_i m_n^{(i)} p_n^{(i)} > \iint_{(p_n)} |f(x, y)| dx dy + n.$$

Можно в этой сумме оставить лишь те слагаемые, которым отвечают $m_n^{(i)} > 0$; обозначив совокупность соответствующих элементов $(p_n^{(i)})$ через $\widetilde{p}_n$, получим, тем более,

$$\iint_{(\widetilde{p}_n)} f(x, y) dx dy = \iint_{(\widetilde{p}_n)} f_+(x, y) dx dy > \iint_{(p_n)} |f(x, y)| dx dy + n.$$

Обозначим через $(\widetilde{P}_n)$ область, составленную из (P_n) и $(\widetilde{p}_n)$; так как

$$\iint_{(P_n)} f(x, y) dx dy \geq - \iint_{(P_n)} |f(x, y)| dx dy,$$

то, складывая почленно это неравенство с предыдущим, найдем

$$\iint_{(\widetilde{P}_n)} f(x, y) dx dy > n.$$

Область $(\widetilde{p}_n)$, а с нею и $(\widetilde{P}_n)$, можно деформировать так, чтобы из последней получилось связная область (P'_n) , и притом по площади столь мало разнящаяся от $(\widetilde{P}_n)$, что все же сохраняется неравенство

$$\iint_{(P'_n)} f(x, y) dx dy > n.$$

Этого легко достигнуть, соединяя оторванные части области узкими «коридорами» с произвольно малой общей площадью.

Отсюда уже ясно, что интеграл (5) сходиться не может, вопреки предположению; это противоречие и доказывает теорему.

Заметим, что принципиальная разница между одномерным и двумерным случаями связана именно с заключительной частью проведенного рассуждения. Несвязную линейную область, состоящую из отдельных промежутков, уже нельзя произвольно малой деформацией превратить в связную (т.е. в цельный промежуток).

Доказанная теорема вместе с замечаниями предыдущего n^0 сводит вопрос о сходимости и вычислении несобственного интеграла от произвольной функции к такому же вопросу для положительной (неотрицательной) функции.

Список литературы

1. Г.М. Фихтенгольц «Курс дифференциального и интегрального исчисления»
В трех томах. Том 3. Издательство Лань, 1997.-672 с.