

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Математика и суперкомпьютерное моделирование»

Курсовая работа
по дисциплине «Дифференциальное и интегральное исчисления»
на тему «Теорема Штольца»

Направление подготовки – 01.03.01 Математика

Профиль подготовки – Вычислительная математика и компьютерные науки

Выполнил студент: _____ Симакова Е.А.

Группа: _____ 19BM1

Руководитель:

к. ф.-м. н., доцент _____ Хорошева Э.А.

Работа защищена с оценкой _____

Преподаватель _____

Дата защиты _____

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедрой МСМ

_____ Смирнов Ю. Г.

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине

«Дифференциальное и интегральное исчисления»

Тема: «Теорема Штольца»

- а) Изучить литературу по теме курсовой работы.
- б) Изложить реферативно изученный по теме теоретический материал.
- в) Самостоятельно придумать и решить задачи по теме курсовой работы.

Руководитель работы, доцент

Хорошева Э.А.

Оглавление

Введение	4
Глава I. Теоретическая часть	5
§1. Числовые последовательности	5
§2. Теорема Штольца	6
§3. Замечание к теореме Штольца.....	9
§4. Примеры применения теоремы Штольца	11
Глава II. Практическая часть	13
Заключение.....	19
Список литературы	20

Введение

Одним из основополагающих разделов курса математического анализа является раздел, изучающий теорию предела последовательности и предела функции. Данная теория является значимой для изучения многих других разделов математического анализа, а также других дисциплин математики.

Целью данной курсовой работы является рассмотрение и доказательство теоремы Штольца. В теоретической части я расскажу о таких темах, как числовая последовательность, теорема Штольца и её доказательство, а также примеры её применения. В практической части я рассмотрю задачи, которые решаются с помощью применения данной теоремы.

Глава I. Теоретическая часть

§1. Числовые последовательности

Представим себе натуральный ряд:

$$1, 2, 3, \dots, n, \dots, \quad (1.1)$$

в котором числа расположены в порядке возрастания, так что большее число n следует за меньшим числом (или меньшее число предшествует большему n). Если теперь заменить в ряде (1), по какому-нибудь закону, каждое натуральное число n некоторым вещественным числом x_n , то получится числовая последовательность:

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots, \quad (1.2)$$

члены или элементы которой x_n занумерованы всеми натуральными числами и расположены в порядке возрастания номеров.

Сокращенно последовательность (1.2) будем обозначать символом $\{x_n\}$.

Введем понятие арифметических операций над числовыми последовательностями. Пусть даны произвольные последовательности $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ и $y_1, y_2, \dots, y_n, \dots$. Суммой этих последовательностей назовем последовательность $x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n, \dots$ (или $\{x_n + y_n\}$), разностью – последовательность $x_1 - y_1, x_2 - y_2, \dots, x_n - y_n, \dots$ (или $\{x_n - y_n\}$), произведением – последовательность $x_1 \cdot y_1, x_2 \cdot y_2, \dots, x_n \cdot y_n, \dots$ (или $\{x_n \cdot y_n\}$), частным – последовательность $\frac{x_1}{y_1}, \frac{x_2}{y_2}, \dots, \frac{x_n}{y_n}, \dots$ (или $\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\}$).

Замечание. При определении частного $\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\}$ нужно требовать, чтобы все элементы y_n последовательности $\{y_n\}$ были отличны от нуля. Однако если у последовательности $\{y_n\}$ обращается в нуль лишь конечное число элементов, то частное $\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\}$ можно определить с того номера, начиная с которого все элементы y_n отличны от нуля.

§2. Теорема Штольца

Во многих случаях для исследования сходимости частного $\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\}$ последовательностей $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ оказывается полезной теорема Штольца.

Теорема Штольца. Пусть $\{y_n\}$ – возрастающая бесконечно большая последовательность, и пусть последовательность $\left\{\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}\right\}$ сходится и имеет предел a . Тогда последовательность $\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\}$ сходится и имеет предел a . Таким образом,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}.$$

Доказательство. Поскольку последовательность $\left\{ \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} \right\}$ сходится и имеет пределом число a , то последовательность $\{\alpha_n\}$, где $\alpha_n = \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} - a$, бесконечно малая. Пусть $\bar{N}$ – любой фиксированный номер и $n > \bar{N}$. Используя выражение для α_n , рассмотрим серию неравенств:

$$\begin{aligned} x_{\bar N+1} - x_{\bar N} &= a(y_{\bar N+1} - y_{\bar N}) + \alpha_{\bar N+1}(y_{\bar N+1} - y_{\bar N}), \\ x_{\bar N+2} - x_{\bar N+1} &= a(y_{\bar N+2} - y_{\bar N+1}) + \alpha_{\bar N+2}(y_{\bar N+2} - y_{\bar N+1}), \\ &\dots\dots\dots \\ x_{n-1} - x_{n-2} &= a(y_{n-1} - y_{n-2}) + \alpha_{n-1}(y_{n-1} - y_{n-2}), \\ x_n - x_{n-1} &= a(y_n - y_{n-1}) + \alpha_n(y_n - y_{n-1}). \end{aligned}$$

Складывая эти равенства, найдем

$$x_n - x_{\bar{N}} = ay_n - ay_{\bar{N}} + \alpha_{\bar{N}+1}(y_{\bar{N}+1} - y_{\bar{N}}) + \alpha_{\bar{N}+2}(y_{\bar{N}+2} - y_{\bar{N}+1}) + \dots$$

$$\dots + \alpha_{n-1}(y_{n-1} - y_{n-2}) + \alpha_n(y_n - y_{n-1}).$$

Так как $\{y_n\}$ – возрастающая бесконечно большая последовательность, то, начиная с некоторого номера, ее элементы положительны. Будем считать, что при $n \geq \bar{N}$ $y_n > 0$.

Тогда из последнего равенства получим

$$\frac{x_n}{y_n} - a = \frac{x_{\bar{N}} - ay_{\bar{N}}}{y_n} + \frac{\alpha_{\bar{N}+1}(y_{\bar{N}+1} - y_{\bar{N}}) + \alpha_{\bar{N}+2}(y_{\bar{N}+2} - y_{\bar{N}+1}) + \dots + \alpha_n(y_n - y_{n-1})}{y_n}.$$

Поскольку последовательность $\{y_n\}$ возрастающая, то разности $y_{k+1} - y_k$, $k = \bar{N}, \bar{N} + 1, \dots, n - 1$, положительны. Поэтому из последнего соотношения имеем

$$\left| \frac{x_n}{y_n} - a \right| \leq \left| \frac{x_{\bar{N}} - ay_{\bar{N}}}{y_n} \right| + \frac{|\alpha_{\bar{N}+1}|(y_{\bar{N}+1} - y_{\bar{N}}) + |\alpha_{\bar{N}+2}|(y_{\bar{N}+2} - y_{\bar{N}+1}) + \dots + |\alpha_n|(y_n - y_{n-1})}{y_n}. \quad (2)$$

Докажем теперь, что последовательность $\left\{ \frac{x_n}{y_n} \right\}$ сходится и имеет предел a .

Для этого достаточно доказать, что для любого положительного ε можно указать номер N такой, что при $n \geq N$ выполняется неравенство $\left| \frac{x_n}{y_n} - a \right| < \varepsilon$.

Во-первых, по данному $\varepsilon > 0$ выберем номер $\bar{N}$ так, чтобы при $n \geq \bar{N}$ выполнялось неравенство $|\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{2}$ (это возможно, поскольку последовательность $\{\alpha_n\}$ бесконечно малая). Далее, выберем номер $N \geq \bar{N}$ так, чтобы при $n \geq N$ выполнялось неравенство $\left| \frac{x_{\bar{N}} - ay_{\bar{N}}}{y_n} \right| < \frac{\varepsilon}{2}$. Такой выбор номера N возможен, поскольку $x_{\bar{N}} - ay_{\bar{N}}$ фиксировано, а последовательность $\{y_n\}$ бесконечно большая, и поэтому последовательность $\left\{ \frac{x_{\bar{N}} - ay_{\bar{N}}}{y_n} \right\}$ бесконечно малая.

Пусть теперь $n \geq N$.

Из неравенства (2) имеем

$$\left| \frac{x_n}{y_n} - a \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon (y_{\bar{N}+1} - y_{\bar{N}}) + (y_{\bar{N}+2} - y_{\bar{N}+1}) + \dots + (y_n - y_{n-1})}{y_n}.$$

Или

$$\left| \frac{x_n}{y_n} - a \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon (y_n - y_{\bar{N}})}{y_n}.$$

Так как при $n \geq N$ $y_n - y_{\bar{N}} \leq y_n$ и $y_n > 0$, то $\frac{(y_n - y_{\bar{N}})}{y_n} \leq 1$.

Поэтому при $n \geq N$ из последнего неравенства имеем

$$\left| \frac{x_n}{y_n} - a \right| < \varepsilon.$$

Теорема Штольца доказана.

§3. Замечание к теореме Штольца

Если $\{y_n\}$ – возрастающая бесконечно большая последовательность, а последовательность $\left\{\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}\right\}$ также бесконечно большая и стремится к бесконечности определенного знака, то последовательность $\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\}$ бесконечно большая.

В самом деле, пусть

$$\left\{\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}\right\} = A_n.$$

Последовательность $\{A_n\}$ бесконечно большая. Имеем при $n \geq \bar{N}$

$$x_{\bar{N}+1} - x_{\bar{N}} = A_{\bar{N}+1}(y_{\bar{N}+1} - y_{\bar{N}}),$$

.....

$$x_n - x_{n-1} = A_n(y_n - y_{n-1}).$$

Складывая эти равенства, найдем

$$x_n - x_{\bar{N}} = A_{\bar{N}+1}(y_{\bar{N}+1} - y_{\bar{N}}) + \dots + A_n(y_n - y_{n-1}).$$

Отсюда

$$\frac{x_n}{y_n} = \frac{A_{\bar{N}+1}(y_{\bar{N}+1} - y_{\bar{N}}) + \dots + A_n(y_n - y_{n-1})}{y_n} + \frac{x_{\bar{N}}}{y_n}.$$

Из этого соотношения имеем

$$\left|\frac{x_n}{y_n}\right| \geq \left|\frac{A_{\bar{N}+1}(y_{\bar{N}+1} - y_{\bar{N}}) + \dots + A_n(y_n - y_{n-1})}{y_n}\right| - \left|\frac{x_{\bar{N}}}{y_n}\right|. \quad (3)$$

Будем для определенности считать, что при $n \geq \bar{N}$ элементы последовательностей $\{y_n\}$ и $\{A_n\}$ положительны. Выберем, далее, по заданному положительному A номер $\bar{N}$ так, чтобы при $n \geq \bar{N}$ выполнялось неравенство $A_n > 4A$, затем такое $N \geq \bar{N}$, что при $n \geq \bar{N}$

$$\left|\frac{x_{\bar{N}}}{y_n}\right| < A, \quad \left|\frac{y_{\bar{N}}}{y_n}\right| < \frac{1}{2}.$$

Возможность выбора такого N обеспечивается тем, что последовательности $\{y_n\}$ и $\{A_n\}$ бесконечно большие и их члены, начиная с некоторого номера, положительны. Очевидно, при $n \geq N$ из неравенства (3) имеем

$$\left| \frac{x_n}{y_n} \right| > 4A \frac{(y_{\bar{N}+1} - y_{\bar{N}}) + \dots + (y_n - y_{n-1})}{y_n} - \left| \frac{x_{\bar{N}}}{y_n} \right|,$$

или

$$\left| \frac{x_n}{y_n} \right| > 4A \left(1 - \frac{y_{\bar{N}}}{y_n} \right) - A > A.$$

Таким образом, последовательность $\left\{ \frac{x_n}{y_n} \right\}$ бесконечно большая.

§4. Примеры применения теоремы Штольца

Пример 1.

Докажем, что если последовательность $\{a_n\}$ сходится и имеет предел a , то последовательность $\left\{\frac{a_1+a_2+\dots+a_n}{n}\right\}$ средних арифметических значений элементов последовательности $\{a_n\}$ сходится к тому же самому пределу a .

В самом деле, если положить $a_1 + a_2 + \dots + a_n = x_n$, а $y_n = n$, то $\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = a_n$. Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ существует, то по теореме Штольца

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

Пример 2.

Рассмотрим теперь последовательность $\{a_n\}$, где

$$a_n = \frac{1^k + 2^k + \dots + n^k}{n^{k+1}}$$

и k – целое положительное число.

Обозначим $1^k + 2^k + \dots + n^k$ через x_n , а n^{k+1} через y_n . Тогда последовательность $\{a_n\}$ приобретает вид $\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\}$. Исследуем сходимость последовательности $\left\{\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}\right\}$. Имеем

$$\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \frac{n^k}{n^{k+1} - (n-1)^{k+1}} = \frac{n^k}{(k+1)n^k - \frac{(k+1)}{2}n^{k-1} + \dots + (-1)^{k+1}}.$$

Поделив числитель и знаменатель последнего выражения на n^k , получим

$$\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \frac{1}{k+1 + \frac{1}{n}[\dots]},$$

где в знаменателе в квадратных скобках опущено выражение, предел которого при $n \rightarrow \infty$ равен $\left[-\frac{(k+1)k}{2}\right]$. Из последней формулы находим

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \frac{1}{k+1}.$$

Следовательно, по теореме Штольца имеем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^k + 2^k + \dots + n^k}{n^{k+1}} = \frac{1}{k+1}.$$

Пример 3.

Рассмотрим последовательность $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$, $a > 1$. Полагая $a_n = x_n$ и $y_n = n$ и исследуя последовательность $\left\{\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}\right\}$, находим

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (a^n - a^{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} a^n \left(1 - \frac{1}{a}\right) = +\infty.$$

Поэтому имеем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n} = +\infty.$$

Глава II. Практическая часть

Задание №1

Используя только теорему Штольца, докажите, что:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 3^2 + \dots + (2n-1)^2}{n^3} = \frac{4}{3}.$$

Решение:

1) Обозначим $1^2 + 3^2 + \dots + (2n-1)^2 = x_n$, тогда $n^3 = y_n$.

Теперь предел будет выглядеть так $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$.

Для того, чтобы найти, чему равен предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$, необходимо найти, чему

равен предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}$.

Получается, что $x_n - x_{n-1} = (1^2 + 3^2 + \dots + (2n-1)^2) - (1^2 + 3^2 + \dots + (2(n-1)-1)^2) = (1^2 + 3^2 + \dots + (2n-1)^2) - (1^2 + 3^2 + \dots + (2n-3)^2)$.

В последовательности $1^2 + 3^2 + \dots + (2n-1)^2$, предпоследний член равен $(2n-3)^2$, следовательно, после сокращения подобных слагаемых

$$x_n - x_{n-1} = (2n-1)^2.$$

Получается, что $y_n - y_{n-1} = n^3 - (n-1)^3 = (n - (n-1))(n^2 + n(n-1) + (n-1)^2) = n^2 + n^2 - n + n^2 - 2n + 1 = 3n^2 - 3n + 1$.

$$\text{Теперь } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 - 4n + 1}{3n^2 - 3n + 1}.$$

2) Воспользуемся теоремой Штольца еще раз.

Обозначим $4n^2 - 4n + 1 = x_n$, тогда $3n^2 - 3n + 1 = y_n$.

Теперь предел будет выглядеть так $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$. Найдем $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}$.

$$x_n - x_{n-1} = 4n^2 - 4n + 1 - (4(n-1)^2 - 4(n-1) + 1) = 4n^2 - 4n + 1 - 4n^2 + 8n - 4 + 4n - 4 + 1 = 8n - 8.$$

$$y_n - y_{n-1} = 3n^2 - 3n + 1 - (3(n-1)^2 - 3(n-1) + 1) = 3n^2 - 3n + 1 - 3n^2 + 6n - 3 + 3n - 3 + 1 = 6n - 6.$$

Теперь $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n-8}{6n-6}$.

3) Применим теорему Штольца в последний раз.

Обозначим $8n - 8 = x_n$, тогда $6n - 6 = y_n$.

Теперь предел будет выглядеть так $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$. Найдем $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}$.

$$x_n - x_{n-1} = 8n - 8 - (8(n-1) - 8) = 8n - 8 - 8n + 8 + 8 = 8.$$

$$y_n - y_{n-1} = 6n - 6 - (6(n-1) - 6) = 6n - 6 - 6n + 6 + 6 = 6.$$

Теперь $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$. Что и требовалось доказать.

Стоит отметить, что если не использовать исключительно теорему Штольца, в

конце шага 1) видно, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 - 4n + 1}{3n^2 - 3n + 1} = \frac{4}{3}$, если и числитель, и знаменатель

дробь разделить на наибольшую из имеющихся степеней — n^2 .

Задание №2

Используя только теорему Штольца, докажите, что:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}{n^4} = 1.$$

Решение:

1) Обозначим $(n+1)(n+2)(n+3)(n+4) = x_n$, тогда $n^4 = y_n$.

Теперь предел будет выглядеть так $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$.

Для того, чтобы найти, чему равен предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$, необходимо найти, чему

равен предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}$.

$$\begin{aligned} \text{Получается, что } x_n - x_{n-1} &= (n+1)(n+2)(n+3)(n+4) - ((n-1+1)(n- \\ &-1+2)(n-1+3)(n-1+4)) = (n^2 + 3n + 2)(n^2 + 7n + 12) - \\ &- (n(n^2 + 3n + 2)(n+3)) = n^4 + 7n^3 + 12n^2 + 3n^3 + 21n^2 + 36n + 2n^2 + \\ &+ 14n + 24 - n^4 - 6n^3 - 11n^2 - 6n = 4n^3 + 24n^2 + 44n + 24. \end{aligned}$$

Получается, что $y_n - y_{n-1} = n^4 - (n-1)^4 = (n^2 - (n-1)^2)(n^2 + (n-1)^2) =$
 $= (n^2 - n^2 + 2n - 1)(n^2 + n^2 - 2n + 1) = (2n - 1)(2n^2 - 2n + 1) = 4n^3 -$
 $-6n^2 + 4n - 1.$

Теперь $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^3 + 24n^2 + 44n + 24}{4n^3 - 6n^2 + 4n - 1}.$

2) Воспользуемся теоремой Штольца еще раз.

Обозначим $4n^3 + 24n^2 + 44n + 24 = x_n$, тогда $4n^3 - 6n^2 + 4n - 1 = y_n$.

Теперь предел будет выглядеть так $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$. Найдем $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}.$

$$x_n - x_{n-1} = 4n^3 + 24n^2 + 44n + 24 - (4(n-1)^3 + 24(n-1)^2 + 44(n-1) + 24) =$$

$$= 4n^3 + 24n^2 + 44n + 24 - 4n^3 + 12n^2 - 12n + 4 - 24n^2 + 48n - 24 -$$

$$-44n + 44 - 24 = 12n^2 + 36n + 24.$$

$$y_n - y_{n-1} = 4n^3 - 6n^2 + 4n - 1 - (4(n-1)^3 - 6(n-1)^2 + 4(n-1) - 1) =$$

$$= 4n^3 - 6n^2 + 4n - 1 - 4n^3 + 12n^2 - 12n + 4 + 6n^2 - 12n + 6 - 4n + 4 +$$

$$+1 = 12n^2 - 24n + 14.$$

Теперь $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{12n^2 + 36n + 24}{12n^2 - 24n + 14}.$

3) Воспользуемся теоремой Штольца третий раз.

Обозначим $12n^2 + 36n + 24 = x_n$, тогда $12n^2 - 24n + 14 = y_n$.

Теперь предел будет выглядеть так $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$. Найдем $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}.$

$$x_n - x_{n-1} = 12n^2 + 36n + 24 - (12(n-1)^2 + 36(n-1) + 24) = 12n^2 +$$

$$+36n + 24 - 12n^2 + 24n - 12 - 36n + 36 - 24 = 24n + 24.$$

$$y_n - y_{n-1} = 12n^2 - 24n + 14 - (12(n-1)^2 - 24(n-1) + 14) = 12n^2 -$$

$$-24n + 14 - 12n^2 + 24n - 12 + 24n - 24 - 14 = 24n - 36.$$

Теперь $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{24n + 24}{24n - 36}.$

4) Применим теорему Штольца в последний раз.

Обозначим $24n + 24 = x_n$, тогда $24n - 36 = y_n$.

Теперь предел будет выглядеть так $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$. Найдем $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}$.

$$x_n - x_{n-1} = 24n + 24 - (24(n-1) + 24) = 24n + 24 - 24n + 24 - 24 = 24.$$

$$y_n - y_{n-1} = 24n - 36 - (24(n-1) - 36) = 24n - 36 - 24n + 24 + 36 = 24.$$

Теперь $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{24}{24} = 1$. Что и требовалось доказать.

Задание №3

Используя теорему Штольца, найдите предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n}{n}.$$

Решение:

Обозначим $5^n = x_n$, тогда $n = y_n$.

Теперь предел будет выглядеть так $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$.

Для того, чтобы найти, чему равен предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$, необходимо найти, чему

равен предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}$.

$$\text{Получается, что } x_n - x_{n-1} = 5^n - 5^{n-1} = 5^n \left(1 - \frac{1}{5}\right) = \frac{4}{5} 5^n.$$

$$\text{Получается, что } y_n - y_{n-1} = n - (n-1) = 1.$$

$$\text{Теперь } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{4}{5} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n}{1} = \infty.$$

Стоит отметить, что пределы вида $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n}$ всегда равны ∞ .

Проверим это на еще одном пределе.

Задание №4

Используя теорему Штольца, докажите, что:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6^{n-2}}{n-2} = \infty.$$

Решение:

Обозначим $6^{n-2} = x_n$, тогда $n - 2 = y_n$.

Теперь предел будет выглядеть так $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$.

Для того, чтобы найти, чему равен предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$, необходимо найти, чему

равен предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}$.

Получается, что $x_n - x_{n-1} = 6^{n-2} - 6^{n-3} = 6^{n-2} \left(1 - \frac{1}{6}\right) = \frac{5}{6} 6^{n-2}$.

Получается, что $y_n - y_{n-1} = n - 2 - (n - 1 - 2) = 1$.

Теперь $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{5}{6} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6^{n-2}}{1} = \infty$.

Что и требовалось доказать.

Задание №5

Используя теорему Штольца, докажите, что:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}}{\ln n} = 1.$$

Решение:

1) Обозначим $1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} = x_n$, тогда $\ln n = y_n$.

Теперь предел будет выглядеть так $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$.

Для того, чтобы найти, чему равен предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$, необходимо найти, чему

равен предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}$.

Получается, что $x_n - x_{n-1} = \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n-1}\right)$.

В последовательности $1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$, предпоследний член равен $\frac{1}{n-1}$, следовательно, после сокращения подобных слагаемых

$$x_n - x_{n-1} = \frac{1}{n}.$$

Получается, что $y_n - y_{n-1} = \ln n - \ln(n-1) = \ln\left(\frac{n}{n-1}\right)$.

$$\text{Теперь } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\ln\left(\frac{n}{n-1}\right)}.$$

2) Воспользуемся теперь правилом Лопиталя. Нам необходимо найти производные числителя и знаменателя предела. Предел отношения производных будет равен исходному пределу.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\ln\left(\frac{n}{n-1}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{n^2}}{\left(\frac{n-1}{n}\right) \cdot \left(\frac{(n-1)-n}{(n-1)^2}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n(n-1)}} = 1$$

Что и требовалось доказать.

Заключение

Теорема Штольца – это важное утверждение математического анализа, необходимое в некоторых случаях, для исследования сходимости частного $\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\}$ последовательностей $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$.

В теоретической части курсовой работы я раскрыла такие темы, как числовая последовательность, теорема Штольца, её доказательство и примеры её применения.

В практической части курсовой работы я рассмотрела задачи по данной теории.

Рассмотренные задачи показывают, что данная теорема в достаточной мере облегчает процесс нахождения пределов неопределённых выражений $\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\}$ типа $\left\{\frac{\infty}{\infty}\right\}$.

Список используемой литературы

1. Архипов Г. И. Лекции по математическому анализу: учеб. для вузов / Г. И. Архипов, В. А. Садовничий, В. Н. Чубариков; под ред. В. А. Садовниченко. – 5-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2004. – 640 с.
2. Демидович Б. П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу: Учеб. пособие для вузов / Б. П. Демидович. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2005. – 558 с.
3. Ильин В. А., Позняк Э. Г. Основы математического анализа: В 2-х ч. Часть I: Учеб.: Для вузов. – 7-е изд., стер. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 648 с.
4. Фихтенгольц Г. М. Основы математического анализа: Учебник. Часть 1. – 10-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 448 с.