

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

**ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Факультет  
физико-математических  
и естественных наук

Кафедра  
«Общая биология и биохимия»

Направление подготовки 06.03.01 Биология  
Профиль подготовки Биохимия  
Форма обучения очная

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА**  
**на тему:**  
**«ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ ОБМЕНА**  
**РЕГУЛЯТОРНЫХ ПЕПТИДОВ В КРОВИ СПОРТСМЕНОВ**  
**ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА В УСЛОВИЯХ**  
**ЛАБОРАТОРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ»**

Студент  Бердиев Ихтиёрджон Бахтиёрович

Руководитель  Соловьев В.Б.

Нормоконтролер  Кручинина А.Д.

Работа допущена к защите (протокол заседания кафедры от 15.06.19 № 16 )

Заведующий кафедрой  Карпова Г.А.

Работа защищена с отметкой   
(протокол заседания ГЭК от 25.06.19 № 3 )

Секретарь ГЭК  Клыченков С.В.

Пенза, 2019

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ .....                                                                                                                                  | 3  |
| ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ .....                                                                                                                 | 6  |
| 1.1 Ферменты обмена регуляторных пептидов .....                                                                                                 | 6  |
| 1.2 Общая характеристика регуляторных пептидов и особенности их функций .....                                                                   | 8  |
| 1.2.1 Карбоксипептидаза N.....                                                                                                                  | 8  |
| 1.2.2 Пептидилдипептидаза A .....                                                                                                               | 11 |
| 1.2.3 Лейцинаминопептидаза .....                                                                                                                | 14 |
| ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ .....                                                                                                  | 15 |
| 2.1 Материал и условия проведения исследований .....                                                                                            | 15 |
| 2.2.1 Общая схема исследования .....                                                                                                            | 15 |
| 2.2.2 Методы моделирования физической работы .....                                                                                              | 15 |
| 2.2.4 Методы определения активности протеолитических ферментов .....                                                                            | 16 |
| 2.2.5 Определение концентрации регуляторных пептидов.....                                                                                       | 19 |
| 2.2.6 Методы статистической обработки .....                                                                                                     | 19 |
| ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.....                                                                                           | 20 |
| 3.1 Влияние физической работы на уровень регуляторных пептидов в крови спортсменов и людей, не занимающихся спортом .....                       | 20 |
| 3.1.1 Роль белковых гормонов, ростовых факторов, регуляторных пептидов и ферментов их обмена в регуляции метаболизма при физической работе..... | 21 |
| 3.1.2 Активность пептидил-дипептидазы A, лизин-карбоксипептидазы и лейциламинопептидазы .....                                                   | 27 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                                                                                                                                | 31 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....                                                                                                                          | 32 |

## ВВЕДЕНИЕ

**Актуальность работы.** В последнее время в биохимии спорта большое внимание уделяется поиску ключевых факторов регуляции метаболизма, воздействие на которые значительно улучшит спортивный результат. Пептидергическая система служит наиболее перспективной мишенью для воздействия. В процессах адаптации нейропептиды представляют немаловажную значимость, осуществляют контроль за состоянием иммунной системы, принимают участие в формировании пищедобывательного и полового поведения [2]. Многие из этих веществ играют важную роль в регулировании полового созревания, оказывают влияние на половую дифференциацию организма, на эмоциональное поведение, на процессы памяти и внимания, обладают обезболивающим действием. Исследования последних нескольких лет свидетельствуют об участии некоторых регуляторных пептидов в реакциях адаптации при физической работе. Ограничения, которые связаны с трудностью введения регуляторных пептидов в организм животных, уменьшают вероятность их применения для регуляции функционального состояния организма и улучшения спортивного результата. Исследование уровня того или иного нейропептида в тканях и сыворотке крови не дает конкретных представлений о динамических процессах, которые происходят в пептидергической системе при физической работе. Для того, чтобы получить как можно больше информации необходимо изучить процессы синтеза и трансформации нейропептидов, так как концентрация биологически активных пептидов зависит от активности ферментов, которые принимают участие в их обмене.

Еще один недостаток существующих работ по исследованию содержания регуляторных пептидов при физической работе – отсутствие дифференциации объектов исследования по степени тренированности. Незначительное число людей могут продемонстрировать высокий

спортивный результат. К этим людям относятся спортсмены высокой квалификации, а обычные, неподготовленные на уровне спортсменов люди, повторить данный результат не в состоянии. Биохимические изменения, сопровождающие спортивный результат, весьма значительны и превосходят изменения, наблюдающиеся у обычных людей, которые не занимаются спортом, как количественно, так и качественно.

Знание путей образования и инактивации регуляторных пептидов, которые участвуют в ответе организма на физическую нагрузку, позволит, избирательно воздействуя на ферменты их метаболизма, регулировать уровень биологических форм тех нейропептидов, от которых зависит спортивный результат [42].

Впервые исследована активность ферментов при физической работе. Получив эти данные, можно приступать к разработке методов направленного влияния на активность ферментов обмена пептидов, которые участвуют в адаптации к физической работе, с целью улучшения спортивного результата.

Целью данной работы является выяснение роли пептидергической системы в адаптации к физической работе у спортсменов высокой квалификации.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи:

- изучение уровня регуляторных пептидов в сыворотке крови здоровых людей и спортсменов высокой квалификации в состоянии покоя;
- исследование активности ферментов обмена регуляторных пептидов (ПДА, ЛКП, ЛАП) в сыворотке крови здоровых людей и спортсменов высокой квалификации в состоянии покоя;
- изучение уровня регуляторных пептидов в сыворотке крови здоровых людей и спортсменов высокой квалификации при физической работе.

Выпускная квалификационная работа написана на 41 листах, содержит 7 рисунков, 1 таблицу и список литературы на русском и английском языках из 78 источников.

# ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

## 1.1 Ферменты обмена регуляторных пептидов

Регуляторные пептиды – обширная группа биологически активных веществ, которые оказывают влияние практически на все физиологические процессы, протекающие в живом организме. Данное понятие объединяет несколько групп соединений, которые отличаются между собой по структуре, функциям и локализации, поэтому установление единой классификации пептидов затруднено. Регуляторные пептиды играют решающую роль в передаче информации внутри клеток и тканей, между тканями и органами в организме или между различными организмами. Они производятся всеми биологическими видами, принадлежащими к разным типам, от бактерий до млекопитающих. Регуляторные пептиды оказывают широкий спектр биологического влияния, действуя, в частности, как нейромедиаторы, нейромодуляторы, гормоны, факторы роста, цитокины и др. Регуляторные пептиды представляют собой сравнительно короткие цепи из аминокислотных остатков. Под действием ферментов протеолиза эти молекулы образуются в организме из более крупных молекул-предшественников [24].

Всем многоклеточным организмам необходимы регуляторные системы для управления множеством функций клеток и которые объединяли бы их в единое целое в пределах организма. В первой половине 20-го века считалось, что существует три таких системы: нервная, иммунная и эндокринная. Данные системы работают самостоятельно и поэтому явления их взаимодействия являются исключением из правил. Но к 60-м годам двадцатого века появилось достаточно доказательств того, что на самом деле эти системы едины. Также было обнаружено звено, соединяющее все три системы в единую – биологически активные пептиды. До этого времени

исследования в области нейрoхимии пептидов и пептидoгидрoлаз были частичными.

Благодаря работам Хьюиса с 70-х годов произошёл существенный прогресс в изучении регуляторных пептидов и ферментов их обмена. В его работах были описаны вещества пептидной природы, которые обладали широким спектром физиологической активности. Также были собраны данные по их распределению и локализации с ферментами их обмена. Успешными были и попытки получить регуляторные пептиды и ферменты в очищенном виде.

Отдельного внимания заслуживает вопрос справедливости использования общепринятых терминов «регуляторные пептиды» и «нейропептиды». Эти и другие наименования на разных этапах изучения получили широкое распространение. В 1969 году все используемые термины были вытеснены понятием «нейропептиды» по предложению Де Вида, так как данное понятие отражало нацеленность предмета исследований и было информационно емким. Но вскоре этот термин подвергся критике, в связи с тем, что большое количество регуляторных пептидов широко экспрессируется и оказывает физиологическое действие и за пределами нервной системы. Было предложено более широкое понятие, которое наиболее полно отражало семантическую значимость термина – «регуляторные пептиды». На сегодняшний день охарактеризован синтез практически всех известных биологически активных пептидов для нервной системы, что дает основания пользоваться термином «нейропептиды» в более широком содержательном аспекте [8].

Сегодня изучены физико-химические свойства пептидов, специфичность их действия, разработан ряд синтетических аналогов физиологически активных пептидов, осуществлён химический синтез регуляторных пептидов, доказано их терапевтическое воздействие.

## **1.2 Общая характеристика регуляторных пептидов и особенности их функций**

Биологически активные пептиды были обнаружены у различных биологических видов – от кишечнорастворимых до человека. Единая классификация регуляторных пептидов отсутствует, но несмотря на это для всех этих молекул характерны следующие свойства: относительно короткая химическая структура, которая включает в себя от 5 до 52 аминокислотных остатков, широкий спектр физиологического действия, образование в результате многоступенчатого гидролиза пептидов-предшественников.

Несмотря на отсутствие строгих закономерностей в строении и выраженную полифункциональность действия, известные классификации регуляторных пептидов в основном основаны на структурно-функциональном подходе. Можно выделить следующие группы пептидов в соответствии с описанными принципами:

- опиоидные пептиды;
- пептиды мозга и кишечника;
- пептиды нервной системы;
- пептидные гормоны;
- вазоактивные пептиды;
- тахикинины;
- иммуномодулирующие пептиды.

Функция большинства регуляторных пептидов реализована с участием ЦНС, как показывает сравнительный анализ.

### **1.2.1 Карбоксипептидаза N**

Карбоксипептидаза N (КПН, энкефалинконвертаза, карбоксипептидаза Е, КФ 3.4.17.10) выделена и охарактеризована из мозга, гипофиза, хромоффинных гранул надпочечников, эндокринных клеток поджелудочной

железы. КППН во всех органах и тканях представлена несколькими формами: растворимой и мембраносвязанной. Обе эти формы являются гликопротеинами, имеют идентичную субстратную специфичность и чувствительность к групп-специфичным реагентам. Молекулярная масса растворимой формы составляет 53-57 кДа, мембраносвязанной формы – 55-57 кДа [45, 52].

Карбоксипептидаза N является тиолзависимым металлоферментом, в активном центре которого находится  $Zn^{2+}$  [54]. Фермент имеет оптимум pH 5,5-6,0, активируется ионами  $Co^{2+}$  в 5-10 раз, ионами  $Ni^{2+}$  в 2-3 раза, ингибируется  $CuCl_2$ ,  $HgCl_2$ , аминопропилмеркаптоянтарной кислотой, 2-меркаптометил-3-гуанидилэтилтиопропановой кислотой, ЭДТА и 1,10-фенантролином. На активность КППН сульфат цинка, хлорид кальция, N-этилмалеимид и ФМСФ не влияют [78]. Наиболее эффективными ингибиторами являются ГЭМЯК и гуанидинопропилянтарная кислота с  $K_i$  8,8 нМ и 7,5 нМ, соответственно. КППН ингибируется Met- и Leu-энкефалинами, веществом P, вазопрессином, окситоцином, тиреотропин-рилизинг-фактором [59].

Уровни мРНК КППН и активности КППН в мозге и тканях в целом коррелируют между собой. Наивысшие уровни мРНК КППН обнаружены в пирамидальных клетках гиппокампа, супраоптическом и паравентрикулярном ядрах, эпендимных клетках боковых желудочков мозга, в передней и промежуточной долях гипофиза, базолатеральной миндалине [64]. Средние уровни мРНК КППН обнаружены в таламусе, коре мозжечка и промежуточной оливе, медиальном коленчатом ядре. Наименьшие уровни выявлены в латеральном гипоталамусе, гранулярном клеточном слое гиппокампа, бледном шаре и в ретикулярной формации ножки мозга [4].

В клетке КППН локализована, в основном, в секреторных гранулах, причем часто совместно с биологически активными пептидами – инсулином

[45], вазопрессином [71], энкефалинами [58], веществом Р [44], окситоцином [70], атриальным натрийуретическим фактором [67].

КПН обладает, практически, абсолютной специфичностью по отношению к пептидным субстратам с С-концевыми остатками основных аминокислот. Она хорошо отщепляет остатки аргинина и лизина от Arg<sup>8</sup>-вазопрессин-Gly-Lys-Arg [71], а также превращает <sup>125</sup>I-Met-энкефалин-Arg<sup>6</sup> и <sup>125</sup>I-Met-энкефалин-Lys<sup>6</sup> в <sup>125</sup>I-Met-энкефалин. Фермент отщепляет остатки -Lys<sup>15</sup>-Lys<sup>16</sup>-Arg<sup>17</sup> с карбоксильного конца фрагмента АКТГ (АКТГ<sub>1-14</sub>) и остатки аргинина с С-конца гиппурил-L-Arg и Leu-энкефалин-Arg [58]. КПН с очень низким сродством отщепляет остаток гистидина с карбоксильного конца проокситоцина [76].

В ответ на внешние воздействия уровень мРНК КПН способен быстро изменяться. Они вызывают изменения уровня биологически активных пептидов или уровня их мРНК. В случае синтеза дефектной (неактивной КПН) (мутация в гене, кодирующем КПН) наблюдается нарушение синтеза и секреции многих биологически активных пептидов.

Физико-химические свойства, тканевая, клеточная и субклеточная локализация, субстратная специфичность, особенности изменения активности фермента при различных фармакологических воздействиях на организм и культуры клеток [13], нарушение синтеза нейропептидов у мышей с дефектной КПН свидетельствуют о том, что исследуемый фермент вовлекается в процессинг многих биологически активных пептидов, таких как энкефалины, нейротензин, АКТГ, вазопрессин, β-эндорфин, окситоцин, меланоцитстимулирующий гормон, вещество Р и др. [6], а также участвует в алкоголизме, стрессе, болезни Альцгеймера, в общем, в адаптационных процессах [31, 38].

### 1.2.2 Пептидилдипептидаза А

Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ, дипептидил-карбоксипептидаза А, кининаза II, карбоксикатепсин, пептидилдипептидаза А, КФ 3.4.15.1) обладает пептидилдипептидазной и слабыми трипептидилкарбоксипептидазной и эндопептидазной активностями [50]. Фермент очищен и выделен из разных тканей различных видов животных [46]. Фермент из всех тканей (эндотелиальная форма), за исключением семенников (тестикулярная форма), имеет очень близкие иммунологические и физико-химические свойства. Фермент из семенников отличается от ангиотензинпревращающего фермента из других источников по иммунологическим свойствам и молекулярной массе

В мозге обнаружена лишь эндотелиальная форма. Эта форма состоит из одной полипептидной цепи, имеет молекулярную массу 170-180 кДа и включает в себя остатки нейтральных сахаров, около 13%. Данная форма состоит из двух гомологичных доменов, каждый из которых имеет активный центр и центр связывания  $Zn^{2+}$  [10].

Разница в степени гликозилирования образует две иммунологически идентичные формы, одна из них (эндотелиальная) с молекулярной массой 180 кДа присутствует (исключая семенники) во всех тканях, также и в мозге, а вторая (нейрональная) с молекулярной массой 170 кДа находится только в мозге, и не наличествует в других тканях [41].

Иногда обнаруживают в различных органах и тканях более высокомолекулярные каталитически активные формы АПФ с молекулярной массой 600 кДа, 430 кДа, 330 кДа, 240 кДа, иммунологически идентичные эндотелиальной форме. До сих пор неясно, являются ли эти формы предшественниками АПФ, или они образуются при гель-фильтрации благодаря возможности молекул фермента, как и других мембраносвязанных белков, к агрегации.  $pI$  фермента из различных органов и тканей колеблется в пределах от 4,6 до 5,1, это обуславливает гетерогенность фермента при

электрофоретическом разделении. Считается, что гетерогенность АПФ имеет важное значение для избирательности регуляции его активизации в различных тканях [25].

АПФ из различных источников имеет оптимум pH 7,6-8,2, для наибольшей активности необходимы ионы  $\text{Cl}^-$  [30]. АПФ содержит 1 прочно связанный ион  $\text{Zn}^{2+}$  на каждый активный центр и сильно ингибируется хелатирующими агентами, такими как ЭДТА и о-фенантролином [61]. Фермент ингибируется брадикининпотенцирующим фактором ( $K_i$  40 нМ), дитиотреитолом, 2-меркаптоэтанолом и додецилсульфатом натрия. N-этилмалеимид, бацитрацин, пуромицин, фосфорамидон, тиорфан, ингибитор металл-зависимых основных карбоксипептидаз ГЭМЯК не имеют влияния на его активность [10]. Уже есть целый класс пептидных аналогов субстратов АПФ с  $K_i$  порядка 10-50 нМ, наиболее известные из них каптоприл ( $\text{IC}_{50} \approx 20$  нМ), еналаприл ( $\text{IC}_{50}$  25-35 нМ), лизиноприл ( $\text{IC}_{50}$  3-10 нМ) [49].

Фермент *in vitro* ускоряет расщепление более 30 биологически активных пептидов и их предшественников [75]. Он изменяет ангиотензин I в ангиотензин II ( $K_m$  4-70 мкМ), отлепляет два дипептида с С-конца брадикинина, расщепляет неокиоторфин с образованием киоторфина ( $K_m$  0,58 мМ), Met-энкефалин-Arg<sup>6</sup>-Phe<sup>7</sup> с образованием Met-энкефалина ( $K_m$  0,30 мМ), вещество Р и вещество К, холецистокинин и гастрин, энкефалин, нейротензин, нейрокинины А и В, рилизинг-фактор лютеинизирующего гормона. АПФ ускоряет образование Met-энкефалин-Arg<sup>6</sup> из Met-энкефалин-Arg<sup>6</sup>-Gly<sup>7</sup>-Leu<sup>8</sup>, отлепляет последовательно два дипептида с С-конца динорфина А 1-8, расщепляет натрийуретический фактор из мозга и предсердий, вазопрессин, окситоцин [23, 57].

Активность АПФ *in vitro* блокируется многими биологически активными пептидами и их предшественниками: неокиоторфином, Met-энкефалин-Arg<sup>6</sup>-Phe<sup>7</sup>,  $\beta$ -липотропином, веществом Р, брадикинином, Leu-энкефалин-Arg<sup>6</sup> и некоторыми дипептидами [10].

АПФ находится в тканях человека и животных. Наиболее высокий уровень АПФ обнаружен в лёгких и семенниках, в почках активность АПФ примерно в 25 раз меньше, чем в лёгких. В сыворотке крови активность АПФ примерно в 200 раз ниже, чем в лёгких [18]. Активность фермента в мозге сопоставима с активностью в почках. Самое высокое содержание АПФ найдено в гипофизе и стриатонигральном тракте. АПФ сконцентрирован в основном в синапсосамах [43]. В стриатонигральном тракте фермент связан с фракцией мембран, в которых содержатся мускариновые рецепторы, также в этой фракции обнаруживается только нейрональная, но не эндотелиальная форма АПФ. Следовательно, на мембранах дендритов сконцентрирована только нейрональная форма АПФ [41].

Установлено, что АПФ является компонентом ренин-ангиотензиновой системы. Он втягивается в обмен ангиотензина и брадикинина в удаленных от центра органах и тканях и становится важным звеном регулирования водно-солевого баланса, воспалительных процессов и артериального давления [60]. Также обнаружено, что АПФ вовлекается в определение эмоционального статуса животных, предрасположенности к потреблению этанола, устойчивости к стрессу [12] и агрессивности [16]. Мозговой АПФ втягивается в формирование наследственной гипертензии, в ответ на воздействие факторов стресса [5, 27] и потребление этанола [17]. Ингибиторы АПФ влияют на потребление воды и этанола, усиливают анальгетическую активность Met-энкефалин-Arg<sup>6</sup>-Leu<sup>7</sup> и уничтожают его деградацию в мозге. Каптоприл, также является антидепрессантом, его антидепрессивный эффект блокируется налоксоном, он усиливает анальгетические эффекты Met- и Leu-энкефалинов, это усиление тоже блокируется налоксоном [68]. То, что АПФ участвует в некоторых физиологических и патологических процессах, а также многие из перечисленных эффектов, которые вызваны введением его ингибиторов, нельзя объяснить, если представить, что единственной функцией АПФ

является участие в обмене ангиотензинов и брадикинина. Можно предположить, что АПФ вовлекается в обмен и других регуляторных пептидов [10], это также подтверждается и высокой активностью фермента в мозге.

### 1.2.3 Лейцинаминопептидаза

Лейцинаминопептидаза (КФ 3.4.11.1) проявляет широкую специфичность и отщепляет практически любые N-концевые аминокислоты, за исключением аланина и цистеина [56]. Она гидролизует амид лейцина лучше, чем ариламид лейцина, с меньшей скоростью расщепляет лизин- и аргининамид. Фермент имеет по данным Хрусталёвой [36] и Fraticante и соавт [51]. Молекулярную массу около 62 кДа, по данным Shimamura и соавт. [74] – 53000, по данным Gibson и соавт [56] – 270 кДа, это позволяет предположить существование субъединичной структуры. Фермент наиболее активен при нейтральных и слабощелочных значениях pH, активируется ионами  $Mn^{2+}$ , ингибируется ПХМФС, бестатином и амастатином; пуромицин и арфаменин А не влияют на его активность [72]. Фермент отщепляет остаток тирозина от Tyr-Gly-Gly, Tyr-Gly-Gly-Phe, Leu-энкефалина, динарфина-(1-8), динарфина-(1-10) и динарфина-(1-13), наибольшая скорость расщепления происходит в случае Leu-энкефалина, если цепь удлинить, то скорость расщепления субстрата резко уменьшается [56]. Активность фермента равномерно распределена между серым и белым веществом коры полушарий. Его обнаружили и в цитозольной и в мембранной фракциях головного мозга, самая большая активность найдена в миелине. Возможно, что лейцинаминопептидазе принадлежит важная роль в инактивации энкефалинов, вещества Р и большинства других регуляторных пептидов [36, 48].

## **ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ**

### **2.1 Материал и условия проведения исследований**

Венозную кровь человека набирали в шприц из локтевой вены. Центрифугировали ее при 4000 g 10 мин, 4 °С, получали сыворотку, замораживали и хранили при -40° С. Чтобы провести исследование, сыворотку нагревали до 4° С, нингидринположительные компоненты удаляли, пропуская сыворотку через колонку с сефадексом G-25. Потом разводили сыворотку физиологическим раствором 1:1.

#### **2.2.1 Общая схема исследования**

В исследовании участвовали спортсмены ГОУ ДОД Школа высшего спортивного мастерства г. Пензы. Специализация спортсменов - легкая атлетика, а именно средний бег и триатлон. Квалификации - мастер спорта и мастер спорта международного класса. Выбирались спортсмены без заболеваний, которые были бы связаны с нарушением обмена веществ.

Также в исследовании участвовали студенты и аспиранты вузов г. Пензы, у которых не было систематических физических нагрузок. Возраст участников 18-28 лет, количество человек одинаковое (n=18). Уровень регуляторных периодов определяли в сыворотке крови и венозной крови. Каждая группа делилась на две подгруппы – интактную и экспериментальную, которая выполняла физическую работу [77].

#### **2.2.2 Методы моделирования физической работы**

Физическая работа для экспериментальных подгрупп спортсменов и людей, не имеющих систематических физических нагрузок, создавалась с помощью программируемого тредбана, начиналась со скорости 3,5 м/с, повышалась каждые две минуты на 0,5 м/с до скорости, когда пульс

поднимался до 180. На этой скорости испытуемый бежал до состояния полного утомления.

## **2.2.4 Методы определения активности протеолитических ферментов**

### **2.2.4.1 Определение активности карбоксипептидазы E**

Активность КПЕ определяли модифицированным методом Fricker и Snyder [62]. 50 мкл гомогената ткани добавляли к 150 мкл (в случае опытной пробы) 50 мМ натрий-ацетатного буфера, pH 5,6, содержащего 50 мМ NaCl или к смеси 140 мкл вышеуказанного буфера и 10 мкл 25 мкМ водного раствора ингибитора ГЭМЯК (в случае контрольной пробы). Далее пробы проинкубировали 8 минут при 37° С. Начинали реакцию прибавлением 50 мкл нагретого до 37° С 210 мкМ раствора дансил-фен-ала-арг, приготовленного на воде (конечная концентрация в реакционной смеси 42 мкМ). Пробы инкубировали 60 минут при 37°С. Останавливали реакцию прибавлением 50 мкл 1М раствора HCl.

Для экстракции продукта реакции дансил-фен-ала приливали к пробам по 1,5 мл хлороформа, сильно встряхивали в течение 60 с. Хлороформную и водную фазы разделяли центрифугированием в течение 10 минут при 1000об/мин.

Флюоресценцию хлороформной фазы измеряли на флюориметре флюорат АБЛФ-Т при  $\lambda_{ex}=360$  нм и  $\lambda_{em}=530$  нм в кювете толщиной 1 см. Для приготовления стандартов использовали раствор дансил-фен-ала в хлороформе [40].

Определяли активность фермента, как разность прироста флюоресценции в пробах, не содержащих и содержащих ГЭМЯК, и выражали в нмоль дансил-фен-ала, образовавшегося за 1 минуту инкубации в пересчете на 1 мг белка [73].

#### **2.2.4.2 Определение активности фенилметилсульфонилфторид-ингибируемой карбоксипептидазы**

Активность ФМСФ-КП определяли флюориметрически [11] с использованием дансил-фен-лей-арг в качестве субстрата. В контрольные пробы вносили 140 мкл 50 мМ натрий-ацетатного буфера, содержащего 50 мМ NaCl, pH 5,6, 50 мкл препарата фермента и 10 мкл 25 мМ ФМСФ, приготовленного на этаноле. После внесения препарата фермента в реакционную смесь вносили ФМСФ. Опытные пробы содержали 150 мкл указанного буфера и 50 мкл препарата фермента. Пробы проинкубировали 8 мин при 37°C, затем вносили 50 мкл предварительно нагретого до 37°C 210 мкМ раствора дансил-фен-лей-арг, приготовленного на воде. Далее пробы обрабатывали как описано для КПН [65]. Для приготовления стандартов использовали раствор дансил-фен-лей в хлороформе.

Активность фермента определяли как разницу прироста флюоресценции в пробах, не содержащих и содержащих ФМСФ, и выражали в нмоль дансил-фен-лей, образовавшегося за 1 мин инкубации в пересчете на 1 мг белка.

#### **2.2.4.3 Определение активности лизин-карбоксипептидазы**

Активность ЛКП определяли по отщеплению Arg от карбоксибензоил-Gly-Arg, в качестве ингибитора использовали ГЭМЯК. К и 40 мкл сыворотки добавляли 20 мкл (в случае опытной пробы) 100 мМ трис-HCl буфера, pH 7,6, или (в случае контрольной пробы) 20 мкл 12,5 мкМ р-ра ГЭМЯК в таком же буфере. Пробы инкубировали 8 мин при 37°C. Реакцию начинали прибавлением 10 мкл карбоксибензоил-Gly-Arg (концентрация в пробе 3.65 мкМ) в 100 мМ трис-HCl буфера, pH 7,6. Пробы инкубировали 120 мин при 37°C. Реакцию останавливали прибавлением 30 мкл 10% раствора трихлоруксусной кислоты. Осадок отделяли центрифугированием в течение 20 мин при 4000 об/мин. Затем отбирали по 50 мкл надосадочной жидкости и определяли количество образовавшегося продукта по приросту свободных

аминогрупп нингидриновым методом, учитывая разницу оптической плотности между опытными и контрольными пробами [15]. Для приготовления стандартов использовали раствор аргинина в 100 мМ трис-НСl буфере, рН 7,6. Активность фермента выражали в нмоль продукта в расчете на 1 мин инкубации и 1 мг белка.

#### **2.2.4.4 Определение активности пептидил-дипептидазы А**

Активность ПДА определяли по отщеплению Gly-Arg от карбоксибензоил-Gly-Gly-Arg при рН=8,2, с использованием каптоприла в качестве ингибитора [20].

Опытные пробы содержали 40 мкл разведенной сыворотки и 20 мкл 100 мМ трис-НСl. Контрольные пробы содержали каптоприл в конечной концентрации 10 мкМ. Пробы инкубировали 8 мин при 37°C, затем вносили по 10 мкл карбоксибензоил-Gly-Gly-Arg (концентрация в пробе 3.65 мкМ) в том же буфере. Пробы инкубировали 120 мин при 37°C. Реакцию останавливали прибавлением 30 мкл 10% раствора трихлоруксусной кислоты. Осадок отделяли центрифугированием в течение 20 мин при 4000 об/мин. Затем отбирали по 50 мкл надосадочной жидкости, активность фермента определяли нингидриновым методом [15, 22] как разницу прироста оптической плотности в пробах, не содержащих и содержащих каптоприл. Для приготовления стандартов использовали раствор аргинина в 100 мМ трис-НСl буфере, рН 7,6. Активность фермента выражали в нмоль продукта в расчете на 1 мин инкубации и 1 мг белка.

#### **2.2.4.5 Определение активности лейциламинопептидазы**

Для определения активности ЛАП к 90 мкл сыворотки прибавляли 10 мкл раствора пурамицина, приготовленного на соответствующем буфере (в случае опытной пробы) и 10 мкл 20 мМ фосфатного буфера, рН 7,4 (в случае контрольной пробы). Проводили преинкубацию 8 мин при 37°C. Реакцию

начинали прибавлением 100 мкл 310 мкМ раствора лей-β-нафтиламина, приготовленного на буфере. Через 30 мин реакцию останавливали прибавлением 40 мкл 10% раствора трихлоруксусной кислоты. Пробы центрифугировали 30 мин при 4000 об/ мин, отбирали 100 мкл надосадочной жидкости, добавляли по 1,5 мл натрий-ацетатного буфера (рН 4,2). Определяли флюоресценцию образовавшегося β-нафтиламина на флюориметре ФМЦ-2 при  $\lambda_{ex}=360$  нм и  $\lambda_{em}=420$  нм в кювете толщиной 1 см. Активность фермента определяли по разнице прироста флюоресценции в пробах, не содержащих и содержащих пуромицин, и выражали в нмоль β-нафтиламина, образовавшегося за 1 мин инкубации в пересчете на 1 мг белка.

### **2.2.5 Определение концентрации регуляторных пептидов**

Содержание регуляторных пептидов осуществлялось различными вариантами иммуноферментного анализа с использованием готовых наборов, изготовленных на заказ фирмой DRG International (Германия) [14].

### **2.2.6 Методы статистической обработки**

Проверка принадлежности распределения признаков к нормальному распределению производилась по критерию хи-квадрат. Достоверность отличий между средними определяли с использованием t-критерия Стьюдента. Анализ отсроченного влияния препаратов, а также физической работы на активность пептидгидролаз проводили с использованием дисперсионного анализа. Принадлежность подгрупп животных к разным гомогенным группам оценивали с помощью метода Шеффе. Сравнение значений каждой из подгрупп дисперсионного комплекса проводили по методике Ньюмена-Кейлса. Корреляционный анализ проводили с помощью эмпирического критерия корреляции.

## **ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ**

### **3.1 Влияние физической работы на уровень регуляторных пептидов в крови спортсменов и людей, не занимающихся спортом**

Одной из актуальных задач функциональной биохимии является комплексное изучение биохимических процессов при различных физиологических состояниях, характеризующихся разной спецификой регуляции обменных реакций. К настоящему времени достигнуты значительные успехи в раскрытии особенностей влияния физической активности на показатели функционирования пептидергической системы, однако имеется большое количество работ, свидетельствующих о разнонаправленных изменениях индивидуальных исследуемых показателей при сходных воздействиях, что связано, по-видимому, с различными моделями и схемами экспериментов. Все это затрудняет понимание роли пептидергической системы в единой интегративной системе регуляции биологических процессов и функций. В нашей работе мы уделили особое внимание регуляторным пептидам, участвующих в ключевых точках взаимодействия пептидергических и других регуляторных систем, обеспечивающих адаптацию к физической работе у высококвалифицированных спортсменов и у людей, не подвергающихся систематической физической нагрузке. Понимание различий в отклике системы регуляторных пептидов на совершение интенсивной физической работы между группами людей, адаптированными и неадаптированными к ней, позволит оценить значимость каждого компонента в приспособительных реакциях [26].

### 3.1.1 Роль белковых гормонов, ростовых факторов, регуляторных пептидов и ферментов их обмена в регуляции метаболизма при физической работе

У спортсменов высокой квалификации не наблюдалось отличий по содержанию люлиберина, ЛГ, ФСГ, пролактина и тестостерона в сыворотке крови от соответствующих показателей нетренированных людей ни в покое, ни при физической работе (рис. 1 и 2). У обеих исследуемых групп уровни этих регуляторных пептидов повышались при нагрузке на одинаковую величину – на 40, 90, 80 и 70 % соответственно.




*Рисунок 1. Влияние физической работы на уровень люлиберина, лютеинизирующего (ЛГ), фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов и пролактина в сыворотке крови спортсменов и людей, не занимающихся спортом.*

Таким образом, существенных перестроек в функционировании системы половых тропных гормонов при адаптации к физической работе не происходит. По-видимому, обеспечение оптимального функционирования репродуктивной системы исключает возможность адаптационных сдвигов в процессах синтеза и секреции ее регуляторных компонентов при систематической физической работе.




*Рисунок 2. Влияние физической работы на уровень тестостерона в сыворотке крови спортсменов и людей, не занимающихся спортом.*

Тем не менее, можно предположить важную роль систематических кратковременных повышений концентраций люлиберина, ЛГ, ФСГ и пролактина при физической работе, поскольку данные пептиды в системе с половыми стероидными гормонами оказывают мощное влияние на мотивационное поведение, а также являются важными компонентами, определяющими статус катаболизм/анаболизм [9, 21, 33]. Данные изменения существенно отличаются от направленности процессов, наблюдаемых при стрессорных воздействиях, характеризующихся снижением синтеза и секреции половых тропных гормонов и андрогенов [66]. Несмотря на сходства со стресс-реакцией в процессах активизации секреции АКТГ,

глюкокортикоидов и опиоидных пептидов [32], обладающих способностью тормозить образование половых гормонов на уровне гипофиза и гонад [7], физическая работа, по-видимому, вызывает активацию синтеза ЛГ, ФСГ, пролактина на уровне протеолитического процессинга готовых форм пропептидов секреторных везикул, что является, вероятно, единственным способом поддержания высокого уровня образования гонадотропинов и половых стероидов при высоких концентрациях гормонов стресса.

Уровни СТГ и ТТГ спортсменов высокой квалификации не отличались от показателей группы здоровых добровольцев ни в состоянии покоя, ни после физической работы (рис. 3).




*Рисунок 3. Влияние физической работы на уровень соматотропного (СТГ) и тиреотропного (ТТГ) гормонов в сыворотке крови спортсменов и людей, не занимающихся спортом.*

Физическая работа вызывала повышение уровней соматотропина и тиротропина у обеих исследуемых групп на 90% и 100% соответственно. Несмотря на вызываемые физической активностью повышение синтеза и секреции данных гормонов, отсутствие адаптационной перестройки в системе их образования у спортсменов, по-видимому, обусловлено наличием широкого спектра физиологической активности у СТГ и ТТГ, а также наличием большого количества регуляторных факторов, опосредующих

частные функции гормонов [3,19]. Повышение уровня тиротропина при физической работе, в первую очередь, вероятно, связано с поддержанием постоянного уровня гормонов щитовидной железы (табл. 1), синтез которых существенно снижен в присутствии высоких концентраций глюкокортикоидов [1, 37, 69].

*Таблица 1– Влияние физической работы на уровень трийодтиронина (Т-3) и тироксина (Т-4) в сыворотке крови спортсменов и людей, не занимающихся спортом ( $M \pm m$ ).*

|             | Спортсмены |             | Неспортсмены |             |
|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|
|             | Норма      | физ. работа | норма        | физ. работа |
| Т-3, мкг/мл | 0,66±0,06  | 0,74±0,08   | 0,71±0,1     | 0,73±0,09   |
| Т-4, мкг/дл | 8,5±1,01   | 9,7±0,94    | 8,8±0,78     | 8,1±0,92    |

Важная роль принадлежит участию СТГ и ТТГ в активации функций нервной системы, влиянием на болевую чувствительность, мотивацию, память, процессы обучения, модуляции синтеза и секреции других регуляторных пептидов и факторов роста [28, 34, 63].

Интересным представляется вопрос о механизмах регуляции уровня соматотропина и тиротропина при повышенных концентрациях глюкокортикоидов, обладающих выраженным ингибирующим влиянием на их синтез и секрецию [39]. Сохранение высоких плазматических концентраций гонадных, ростовых и тиреоидных гормонов пептидной природы в присутствии высоких концентраций кортизола и кортикостерона является важнейшим адаптационным механизмом при физической работе, для раскрытия деталей которого необходимо изучение активности пептидгидролаз, участвующих в их обмене, в норме и при физической работе.

В состоянии покоя уровень IGF-1 и TGF- $\alpha$  у спортсменов высокой квалификации был выше, чем у неспортсменов на 30% и 45% соответственно (рис. 4).




Рисунок 4. Влияние физической работы на уровень инсулиноподобного фактора роста (IGF-1) и трансформирующий фактор роста  $\alpha$  (TGF- $\alpha$ ) в сыворотке крови спортсменов и людей, не занимающихся спортом.

Физическая работа вызывала более выраженное повышение уровня TGF- $\alpha$  у неспортсменов (на 110%), чем у спортсменов, уровень TGF- $\alpha$  которых увеличивался примерно на 60 %. У обеих экспериментальных групп физическая работа вызывала повышение уровня IGF-1 примерно на 40%. Таким образом, плазматический уровень ростовых факторов у спортсменов высокой квалификации выше, чем у группы здоровых добровольцев и в состоянии покоя и при физической работе, что свидетельствует о вовлечении данных пептидов в восстановительные и цитопротекторные реакции, способствующие адаптации организма к высокой физической активности. IGF-1 и TGF- $\alpha$  оказывают протективный эффект при повреждениях мозга, защищают нервные клетки от эксайтотоксичности глутамата и NMDA, способствуют репарационным процессам в нервной системе [47, 55].

Содержание вещества Р в сыворотке крови спортсменов в покое было на 60% выше, чем у неспортсменов (рис. 5). При физической работе у спортсменов не наблюдалось изменений в его концентрации, в то время как у неспортсменов происходило повышение уровня вещества Р на 60%.




*Рисунок 5. Влияние физической работы на уровень вещества Р в сыворотке крови спортсменов и людей, не занимающихся спортом.*

Вещество Р обладает широким спектром физиологической активности: регулирует артериальное давление крови, капиллярную проницаемость, сокращение гладкой мускулатуры, обладает секретогенным действием, регулирует высвобождение пролактина и пищеварительных гормонов [29]. Отмечена важная роль в регуляции функций нервной системы – участие в передаче сенсорной информации, модуляции болевой чувствительности, в процессах запоминания и воспроизведения информации, причем значительная часть информации о биологической роли вещества Р получена в экспериментах по моделированию физической работы [35, 69]. Эти факты, а также данные о существенном увеличении уровня вещества Р в сыворотке крови спортсменов по сравнению с группой здоровых добровольцев свидетельствуют о важной роли пептида в адаптации к физической работе.

### **3.1.2 Активность пептидил-дипептидазы А, лизин-карбоксипептидазы и лейциламинопептидазы**

Активность пептидил-дипептидазы А, лизин-карбоксипептидазы и лейциламинопептидазы у спортсменов в физиологическом состоянии была выше, чем у людей, не занимающихся спортом (рис. 6).

После физической работы у спортсменов не наблюдалось изменений в активности исследуемых ферментов, в то время как у неспортсменов происходило повышение активности данных пептидгидролаз. Существенное повышение активности пептидгидролаз сыворотки крови при физической нагрузке у здоровых добровольцев, а также отличия в активности ферментов у спортсменов и неспортсменов в состоянии покоя свидетельствуют об участии данных пептидгидролаз в регуляции уровня регуляторных пептидов, ростовых факторов и гормональных белков при физической работе и адаптационных перестройках функционирования пептидергической системы.





*Рисунок 6. Влияние физической работы на активность пептидил-дипептидазы А (ПДА), лизин-карбоксипептидазы (ЛКП) и лейциламинопептидазы (ЛАП) в сыворотке крови спортсменов и людей, не занимающихся спортом.*




*Рисунок 7. Влияние физической работы на активность пептидил-дипептидазы А (ПДА), лизин-карбоксипептидазы (ЛКП) и лейциламинопептидазы (ЛАП) в сыворотке крови спортсменов и людей, не занимающихся спортом.*

Интересным представляется вопрос о механизмах влияния физической работы на активность изучаемых ферментов. Известно, что глюкокортикоиды регулируют активность многих ферментов путём изменения экспрессии их генов. Однако к настоящему времени вопрос о возможности влияния глюкокортикоидов на уровень экспрессии ПДА, ЛКП и ЛАП остается до конца не изученным [21, 69]. Повышенный уровень глюкокортикоидов у спортсменов высокой квалификации в состоянии покоя и наблюдаемое при физической работе увеличение концентрации кортизола и кортикостерона у здоровых добровольцев коррелирует с повышенной активностью ферментов. Эти данные, наряду с публикациями о корреляции между уровнем глюкокортикоидов и активностью пептидгидролаз [11, 53, 76] свидетельствуют о высокой вероятности подобного способа регуляции активности ПДА, ЛКП и ЛАП при физической работе. Вместе с тем, многие

нейропептиды влияют на экспрессию генов, в том числе генов пептидгидролаз [3]. Следовательно, изменение уровня нейропептидов при физической работе вследствие выброса биологически активных форм из секреторных гранул может приводить к изменению активности пептидгидролаз, посредством влияния этих нейропептидов на уровень экспрессии мРНК ферментов.

Таким образом, физическая работа вызывала существенное увеличение плазматических концентраций всех исследуемых пептидов и белков, кроме того, наблюдались выраженные отличия в уровнях инсулина, глюкагона, лептина, АКТГ, IGF-1, TGF- $\alpha$  и вещества Р у спортсменов и неспортсменов в состоянии покоя. Несмотря на сходство наблюдаемых изменений с данными, характерными для стресс-реакции, физическая работа характеризуется увеличением уровней ростовых, гонадотропных и тиреотропных пептидов, синтез и секреция которых существенно подавляется при всех видах стресса. Наиболее вероятным механизмом увеличения продукции данных нейропептидов при физической работе в условиях высоких концентраций глюкокортикоидов является активация протеолитического процессинга предшественников биологически активных форм пептидов данной группы. Отличия в активности пептидил-дипептидазы А, лизин-карбоксипептидазы и лейциламинопептидазы у спортсменов и неспортсменов, а также повышение активности данных ферментов при физической нагрузке у здоровых добровольцев частично подтверждают данную гипотезу. Тем не менее, по причине локализации синтеза большинства исследованных пептидов в отделах головного мозга, для более полного выяснения механизмов адаптивного увеличения уровней регуляторных пептидов при физической работе, необходимо исследование активности пептидгидролаз в нервной системе при физической работе.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Физическая работа, которая вызывает существенную активацию пептидергической системы, проявляющуюся, прежде всего, увеличением плазматической концентрации регуляторных пептидов, гормонов и ростовых факторов, участвующих в адекватной активизации метаболизма возрастающим энергетическим потребностям, модулирующих функциональную активность нервной системы и выполняющих цитопротекторные функции.

2. В увеличении содержания регуляторных пептидов в сыворотке крови важную роль играет активизация процессов протеолитического процессинга и модификации биологически активных форм пептидов, о чем свидетельствует высокая положительная корреляция между сдвигами уровней пептидов и активностью пептидгидролаз сыворотки крови.

3. Впервые показано, что пептидергическая система спортсменов высокой квалификации функционирует более активно, чем у неспортсменов, что выражается в существенных различиях в активности пептидгидролаз, уровне большинства регуляторных пептидов и контролируемых ими показателях в состоянии покоя.

4. Физическая работа вызывает менее выраженные изменения в уровне регуляторных пептидов и активности ферментов их обмена у спортсменов, чем у людей, не занимающихся спортом, при более выраженных сдвигах в содержании метаболитов и показателях КОС, что свидетельствует о высокой адаптационной значимости различий в функционировании пептидергической системы у этих исследуемых групп в состоянии покоя.

5. Одним из основных биохимических механизмов, лежащих в основе увеличения физической работоспособности при систематической физической работе, может служить выявленная нами перестройка функционирования системы синтеза и модификации регуляторных пептидов.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ашмарин И.П., Каразеева Е.П. Нейропептиды // в кн. “Нейрохимия” под ред. Ашмарина И.П., Стукалова П.В. М.: Издательство института биомедицинской химии РАМН, 1996. 296-333 с.
2. Бабичев В.Н. Нейроэндокринный контроль процессов пубертации // Усп. совр. биол. 1994. 114 с, № 3. 330-344 с.
3. Бабичев В.Н., Миронов С.Ф. Нейропептиды мозга и их нейроэндокринные эффекты // Пробл. эндокринол. 1981. № 3. 78-85 с.
4. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение / Пер. с англ. М.: Мир, 1988. 248 с.
5. Бэйрд Д.Т. Яичник / Гормональная регуляция размножения у млекопитающих. М.: Мир. 1987. 118-144 с.
6. Вернигора А.Н., Генгин М.Т. Механизм регуляции активности и биологическая роль карбоксипептидазы Н – фермента процессинга нейропептидов // Биохимия 1995. 60 с, № 12. 1491-1497 с.
7. Вернигора А.Н., Генгин М.Т. Протеолитические ферменты: субклеточная локализация, свойства и участие в обмене нейропептидов // Биохимия. 1996. 61 с, № 5. 771-785 с.
8. Вернигора А.Н., Генгин М.Т., Никишин Н.Н. Об участии некоторых ферментов нейропептидов в механизмах эмоционального стресса // Физиол. журн. 1995. т.81. №5. 1025-1028 с.
9. Вернигора А.Н., Генгин М.Т., Никишин Н.Н. Множественность молекулярных форм растворимых карбоксипептидазо-В-подобных ферментов головного мозга кошки // Укр. биохим. журн. 1993. 65 с, № 4. 17-21 с.

10. Вернигора А.Н., Никишин Н.Н., Генгин М.Т. О взаимосвязи между активностью карбоксипептидазы N и ангиотензинпревращающего фермента // Биохимия. 1995. 60 с, N 1. 144-149 с.
11. Генгин М.Т. Особенности структурно-функциональной организации и физико-химические свойства нелизосомальных пептидгидролаз мозга животных: Автореф. дис. ... док. биол. наук. Пенза, 2002.
12. Генгин М.Т., Вернигора А.Н., Никишин Н.Н., Щетинина Н.В. Активность карбоксипептидазы N и ангиотензинпревращающего фермента в сыворотке крови крыс в норме и при эмоциональном стрессе // Укр. биохим. журн. 1994. 66 с, № 2. 139-142 с.
13. Генгин М.Т., Соловьев В.Б., Сметанин В.А., Пазялова А.А., Симкина О.В., Коновалов А.Н., Кузичкин Д.С., Шашкина Н.К., Генгина Н.М., Субботина К.Б. Влияние атропина на активность ангиотензин-превращающего фермента и карбоксипептидазы N в сыворотке крови крыс // Украинский биохимический журнал. 2005. Т. 77, № 6. 78-80 с.
14. Гомазков О.А. Функциональная биохимия регуляторных пептидов.– М.: Наука. 1993.
15. Гомазков О.А. Энзимологические основы физиологического действия регуляторных пептидов // Биологические науки. 1986. № 2. 13-23 с.
16. Гомазков О.А., Комиссарова Н.В., Петрий О.П., Панфилов А.Д. Возрастные и регионарные изменения ангиотензинпревращающей и кининдеградирующей активности в мозге агрессивных крыс // Бюлл. эксперим. биол. мед. 1987. 104, № 7. 18-20 с.
17. Гомазков О.А., Панфилов А.Д., Комиссарова Н.В., Ростовцев А.П. Влияние длительного потребления этанола на физиологическое

состояние и изменения активности пептидаз мозга у мурицидных (агрессивных) крыс // Журн. высш. нервн. деят. 1992. 42, № 4. Р. 771-777.

18. Гомазков О.А., Панфилов А.Д., Ростовцев А.П., Комиссарова Н.В., Фомин В.В., Григорьянц О.О. Регионарная активность энкефалин- и ангиотензин II-образующих пептидаз мозга и периферических тканей у крыс с различным влечением к этанолу // Вопр. мед. химии. 1991. 37, N 4. 33-37 с.

19. Гормонотерапия: Пер. с нем. / Под ред. Шамбаха Х., Кнаппе Г., Карола В. М.: Медицина, 1988, 416 с.

20. Дмитриев А.Д. Биосинтез нейропептидов // Итоги науки и техники ВИНТИ. Фармакол. химиотерапевт. средства. 1982. 43. 7-49 с.

21. Држевецкая И.А. Основы физиологии обмена веществ и эндокринной системы. М.: Высш. шк., 1994, 256 с.

22. Замятнин А.А. Общие функциональные особенности эндогенных регуляторных олигопептидов // Физиол. ж. 1992. 78, № 9. 39-49 с.

23. Звягинцева М.А. Роль пептида дельта-сна в электрической стабильности сердца // Кардиология. 1988. №3. 89-91 с.

24. Корнева Е.А. Регуляторные пептиды как модуляторы защитных функций организма // Физиол. ж. 1985. 75, № 5. 656-665 с.

25. Кост О.А., Ламзина Н.А., Казанская Н.Ф. Микрогетерогенность ангиотензин-превращающего фермента, как фактор регуляции его в организме // Механизмы регуляции клеточной активности: (Ташкент, 18 – 22 сент. 1989 г.): Тез. докл. Москва, 1989. 40 с.

26. Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека: В 2-х томах. Пер. с англ. / Под ред. Гиномана Л.М. М.: Мир, 1993.
27. Никишин Н.Н., Вернигора А.Н., Генгин М.Т. Активность ангиотензинпревращающего фермента в отделах головного мозга крыс, обладающих различной устойчивостью к эмоциональному стрессу в норме и при стрессе // Укр. биохим. журн. 1994. 66, № 5. 53-57 с.
28. Панченко Л.Ф., Брусов О.С., Беляев Н.А. Исследование механизма действия этанола на активность энкефалиназы А мозга крыс // Бюлл. эксперим. биол. мед. 1984. 97, № 6. 691-692 с.
29. Ремяк В.И. Некоторые нейрхимические критерии прогноза эффективности терапии атропиновыми комами больных шизофренией // Тезисы докл. IX Всесоюз. конференции по биох. НС. 1983. Ереван.
30. Сахаров И.Ю., Данилов С.М., Духанина Е.А. Получение и молекулярно-кинетические свойства ангиотензинпревращающего фермента из сердца человека // Биохимия. 1986. 51, N 11. 1836-1842.
31. Соловьев В.Б., Генгин М.Т. Активность пептидил-дипептидазы А и карбоксипептидазы N в сыворотке крови пациентов с болезнью Альцгеймера // Украинский биохимический журнал. 2007. Т. 79, № 6. С. 103-105 с.
32. Судаков К. В. Олигопептиды в механизмах устойчивости к эмоциональному стрессу//Патол. физиология и эксперим. терапия.1989.- Вып. 1.3-11 с.
33. Сухоруков В.С., Тарабрин С.Б. Роль пролактина в регуляции функций мужской гонады // Усп. совр. биол. 1993. 113, № 3. 366-376 с.

34. Теппермен Дж., Теппермен У. Физиология обмена веществ и эндокринной системы. Вводный курс: Пер. с англ. / Под ред. Ажипа Я.И. М.: Мир, 1989.
35. Федоров Б. М. Стресс и система кровообращения. -М.: Медицина, 1991. 320с
36. Хрусталева Н.А. Выделение, очистка, некоторые физико-химические свойства лейцинаминопептидазы миелина и диагностическое значение этого фермента при демиелинизирующих заболеваниях // Автореф. канд. дис. Москва. 1987.
37. Юматов Е.А. Пептидно-нейромедиаторные механизмы устойчивости к эмоциональному стрессу // Стресс и психологическая патология. М.: Московский НИИ психиатрии, 1983. 7-12 с.
38. Юматов Е.А., Гехт К., Скоцеляс Ю.Г. Субстанция Р как фактор устойчивости к эмоциональному стрессу // Журн. выс. нервн. деятельности. 1984. 34. 4. 771-777 с.
39. Azaryan A.V., Hook V.Y.H. Distinct properties of prohormone thiol protease (Ptp) compared to cathepsin B, cathepsin L, and cathepsin H - evidence for Ptp as a novel cysteine protease // Arch. Biochem. Biophys. 1994. 314, N 1. P. 171-177 с.
40. Azaryan A.V., Hook V.Y.H. Unique cleavage specificity of prohormone thiol protease related to proenkephalin processing // FEBS Lett. 1994. 341, N 2-3. P. 197-202 с.
41. Barnes K., Turner A.J., Kenny A.J. Membrane localization of endopeptidase-24.11 and peptidyl dipeptidase A (angiotensin converting enzyme) in the pig brain: a study using subcellular fractionation and electron microscopic immunocytochemistry // J. Neurochem. 1992. 58, N 6. P. 2088-2096.

42. Bouassida A. et al. // J. of Sports Science and Med. 2006, V 5, P. 172 – 181 c.
43. Clemens D.L., Okamura T., Inagami T. Subcellular localization of angiotensin-converting enzyme in cultured neuroblastoma cells // J. Neurochem. 1986. 47, N 6. P. 1837-1842.
44. Chesselet M.F., Hook V.Y. Carboxypeptidase H-like immunoreactivity in the striatum of cats and monkeys // Regul. Pept. 1988. 20, N 2. P. 151-159 c.
45. Davidson H.W., Hutton J.C. The insulin-secreting-granule carboxypeptidase H: Purification and demonstration of involvement in proinsulin processing // Biochem. J. 1987. 245, N 2. P. 575-582 c.
46. Demmer W., Brand K. A dipeptidyl carboxypeptidase in brain synaptic membranes active in the metabolism of enkephalin containing peptides // Biochem. Biophys. Res. Commun. 1983. 114 c, N 2. P. 804-812.
47. Devi L. Tissue distribution of a dynorphin-processing endopeptidase // Endocrinology. 1993. 132 c, N 3. – P. 1139-1144.
48. Dupont A., Sabord P., Merand G. et al. Age-related changes in central nervous system enkephalins substance P // Life Sci. 1981. Vol. 29. №22. P. 2317-2322.
49. Edwards C.R., Padfield P.L. Angiotensin-converting enzyme inhibitors: past, present and bright future // Lancet. 1985. 8419. 30-34 c.
50. Erdos E.G., Skidgel R.A. Angiotensin-I-converting enzyme // Lab. Invest. 1987. 56, N 4. 345-348 c.
51. Fraticante L.I., Rotrosen I., Siekierski I., Fracer H., Gershon S. Enkephalin inactivation by N-terminal tyrosine cleavage: purification and partial characterisation of a highly specific enzyme from human brain // Life Sci. 1980. 26, N 20. P. 1697-1706.

52. Fricker L.D., Plummer T.H., Snyder S.H. Enkephalin convertase: potent, selective and irreversible inhibitors // Biochem. and Biophys. Res. Commun. 1983. 11, N 3. P. 994-1000.
53. Fricker L.D., Snyder S.H. Enkephalin convertase: purification and characterization of a specific enkephalin-synthesizing carboxypeptidase localized to adrenal chromaffin granules // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1982. 79. P. 3886-3890.
54. Fricker L.D., Snyder S.H. Purification and characterization of enkephalin convertase, an enkephalin-synthesizing carboxypeptidase // J. Biol. Chem. 1983. 258, N 18. P. 10950-10955.
55. Gainer H., Russell J.T., Loh Y.P. The enzymology and intracellular organization of peptide precursor processing: the secretory vesicle hypothesis // Neuroendocrinology. - 1985. 40, N 1. P. 171-184. 1992. 131, N 3.
56. Gibson A.M., Biggins J.A., Lauffart B., Mantle D., McDermott J.R. Human brain leucyl aminopeptidase: Isolation, characterization and specificity against some neuropeptides // Neuropeptides. 1991. 19, N 3. P. 163-168.
57. Jukic D. Neurokinin receptors antagonists: old and new. // Life Sci. 1991, Vol. 49, P. 1463.
58. Hook V.Y. Carboxypeptidase B-like activity for the processing of enkephalin precursors in the membrane component of bovine adrenomedullary chromaffin granules // Neuropeptides. 1984. 4, N 2. P. 117-126 c.
59. Hook V.Y.H., LaGamma E.F. Product inhibition of carboxypeptidase H // J. Biol. Chem. 1987. 262, N 26. P. 12583-12588.

60. Hooper N.M. Angiotensin converting enzyme: implications from molecular biology for its physiological functions // *Int. J. Biochem.* 1991. 23, N 7/8. P. 641-647.
61. Hooper N.M., Turner A.J. Characterization of angiotensin-converting enzyme from pig brain // *Biochem. Soc. Trans.* 1986. 14, N 6. P. 1249-1250.
62. Hughes J. (ed.). Centrally Acting Peptides, University Park Press, 1978. Iversen S.D., Iversen L.L. Behavioral pharmacology, Oxford University Press, second
63. Krause J. // *PNAS USA* 1987, Vol. 84, P. 881.
64. L.D. Peptide processing exopeptidases: amino- and carboxypeptidases involved with peptide biosynthesis // *Peptide biosynthesis and processing* (Fricker L.D. ed.), CRC Press, Boca Raton, Florida, 1991. P. 199-230.
65. Loh Y.P., Birch N.P., Castro M.G. Pro-opiomelanocortin and pro-vasopressin converting enzyme in pituitary secretory vesicles // *Biochimie.* – 1988. 70, N 1. P. 11-16.
66. Loh Y.P., Parish D.C., Tuteja R. Purification and characterization of a paired basic residue-specific pro-opiomelanocortin converting enzyme from bovine pituitary intermediate lobe secretory vesicles // *J. Biol. Chem.* 1985. 260, N 12.
67. Lynch D.R., Venable J.C., Snyder S.H. Enkephalin convertase in the heart: similar disposition to atrial natriuretic factor // *Endocrinology.* 122, N 6. P. 2683-2691.
68. Maggi C., Manzini S. Tachykinin Receptor Antagonists. // *Drugs and the Lung* 1994, 507-520.
69. Nawa H. // *Nature* 1983, Vol. 306, P. 32.

70. Norenberg U., Richter D. Processing of the oxytocin precursor: isolation of an exopeptidase from neurosecretory granules of bovine pituitaries // *Biochem. Biophys. Res. Commun.* 1988. 156, N 2. P. 898-904.
71. Rouille Y., Chauvet J., Acher R. Partial conversion of vasopressinyl-Gly-Lys-Arg into pharmacologically active vasopressin through secretory granule carboxypeptidase E and alpha-amidating processing enzymes // *Biochem. Int.* 1992. 26, N 4. P.739-746.
72. Schnebli H.P., Phillipps M.A., Barclay R.K. Isolation and characterization of an enkephalin-degrading aminopeptidase from rat brain // *Biochim. Biophys. Acta.* 1979. 569, N 1. P. 89-98.
73. Seidah N.G., Chretien M. Proprotein and prohormone convertases of the subtilisin family - recent developments and future perspectives // *Trends Endocrinol. Met.* 1992. 3, N 4. P. 133-140.
74. Shimamura M., Hazato T., Iwaguchi T. A new aminopeptidase in monkey cerebral membrane fraction: hydrolysis of enkephalin // *Brain Res.* – 1988. 445. P. 350-353.
75. Skidgel R.A., Erdos E.G. The broad substrate specificity of human angiotensin I converting enzyme // *Clin. Exp. Hypertens.* – 1987. A9, N 2/3. 243-259 c.
76. Smyth D.G., Maruthainar K., Darby N.J., Fricker L.D. Catalysis of slow C terminal processing reactions by carboxypeptidase H // *J. Neurochem.* 1989. 53, N 2. P. 489-493.
77. Steiner D.F. The biosynthesis of biologically active peptides: a perspective // *Peptide Biosynthesis and Processing* (Fricker L.D., ed.). CRC Press, Boca Raton, Florida, 1991. P. 1-16.

78. Supattapone S., Fricker L.D., Snyder S.H. Purification and characterization of a membrane-bound enkephalin-forming carboxypeptidase, «enkephalin convertase» // Neurochem. 1984. 42, N 4. P. 1017-1023.