

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
Кафедра «Педиатрия»**

***ТЕМА: «СЕМИОТИКА  
НАРУШЕНИЙ, ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВИ И  
КРОВЕТВОРНОЙ СИСТЕМЫ»***

**Специальность – 31.05.02 Педиатрия**

**Выполнила: ст. гр. 17лп1**

**Разина А.А.**

**Руководитель: к.м.н., доцент**

**Мусатова Л.А.**


# СОДЕРЖАНИЕ

- Анемии
- ДВС – синдром
- Геморрагический синдром
- Классификация геморрагических диатезов
- Лейкозы
- Список используемой литературы





# АНЕМИЯ

- **Анемия** — это патологическое состояние, для которого характерно уменьшение количества эритроцитов и содержания гемоглобина (отдельно или вместе обоих признаков) в единице объема крови. Это наиболее частая патология крови, возникающая у детей.



# По этиологическому фактору различают 3 основные группы анемий:


1. Анемии вследствие кровопотерь (постгеморрагические).  
В анализе крови определяется уменьшение количества эритроцитов и гемоглобина, нормохромия, ретикулоцитоз спустя некоторое время.



## 2. Анемии вследствие нарушенного кровообразования:

- **железодефицитные анемии** — это анемии, в генезе которых лежит дефицит железа в организме в связи с нарушением его поступления, всасывания или повышенных потерь). Причины:

- экзогенная недостаточность железа, когда ребенок не получает необходимого количества железа с пищей — алиментарная анемия;
- экзогенная недостаточность железа во время повышенной потребности организма (при инфекционных заболеваниях);
- эндогенная недостаточность железа из-за нарушения его усвоения (заболевания желудочно-кишечного тракта).



# ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЖДА:

- слабость, быстрая утомляемость или раздражительность;
- головная боль, головокружение, шум в ушах — характерны для значительной анемии;
- снижение остроты зрения и нарушения в виде «мушек» перед глазами;
- снижение аппетита вплоть до анорексии; искажение вкуса («Pica Chlorotica») — ребенок ест мел, песок, глину, землю;
- одышка и повышение частоты сердцебиения при физической нагрузке;
- бледность, сухость кожи и слизистых оболочек;
- ломкость волос;
- нередко: недержание мочи при смехе, чихании; ночной энурез; диспепсия;



# ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЖДА:

- задержка физического и нервно-психического развития (40%);

- аускультация сердца — систолический шум, тахикардия, ослабление тонов сердца. Шум функционального характера;

- снижение АД;

- при тяжелых формах гепатолиенальный синдром;

- снижение иммунитета — частые воспалительные процессы, т.е. ЖДА


является признаком отягощенного преморбидного фона .



# ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- уменьшение количества эритроцитов и содержания гемоглобина;
- пойкилоцитоз ;
- анизоцитоз, микроцитоз;
- могут быть незрелые эритроциты (эритро-, нормо- , мегалобласты);
- через некоторое время ретикулоцитоз — признак положительный, что указывает на хорошую регенераторную способность костного мозга в ответ на анемию;

## Начальная стадия железодефицитной анемии






| Показа<br>тели         | ЖДА      |
|------------------------|----------|
| Нб                     | ↓        |
| Эритроциты             | ↓        |
| ЦП                     | ↓        |
| Диаметр<br>эритроцитов | ↓        |
| MCV                    | норма, ↓ |
| MCH                    | ↓        |
| MCHC                   | ↓        |
| Ретикулоциты           | норма    |

# ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ В12-(ФОЛИЕВО)-ДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ

- экзогенная недостаточность витамина В12-(фолиевой кислоты):

в педиатрии частой причиной бывает кормление ребенка козьим или сухим молоком при искусственном вскармливании — нутритивная (алиментарная) дефицитная анемия:

- нередко возникает при длительном приеме фенобарбитала, назначаемого при судорожном синдроме - медикаментозная дефицитная анемия;
- эндогенная недостаточность витамина В12 в результате нарушения переваривания и всасывания витамина в желудочно-кишечном тракте (у недоношенных детей, при целиакии, глистной инвазии, гастрите) и др.




|      |       |   |       |
|------|-------|---|-------|
| WBC  | 12.1  | H |       |
|      | %     |   | #     |
| NE   | 71.1  | H | 8.5 H |
| LY   | 15.9  | L | 1.9   |
| MO   | 3.3   |   | 0.5   |
| EO   | 0.5   | L | 0.1   |
| BA   | 8.7   | H | 1.1 H |
| RBC  | 2.69  | L |       |
| HGB  | 10.6  | L |       |
| HCT  | 31.6  | L |       |
| MCV  | 117.6 | H |       |
| MCH  | 39.6  | H |       |
| MCHC | 33.7  |   |       |
| RDW  | 14.1  |   |       |
| PLT  | 578   | H |       |
| MPV  | 7.2   | L |       |

### 3. АНЕМИИ ВСЛЕДСТВИЕ ПОВЫШЕННОГО КРОВЕРАЗРУШЕНИЯ (ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ АНЕМИИ)

#### Гемолитический синдром:

это проявление группы заболеваний, общим признаком которых является усиленный гемолиз эритроцитов, что приводит с одной стороны, к анемии и повышенному образованию продуктов распада эритроцитов, а с другой — к усиленному эритропоэзу как компенсаторной реакции на возникшую анемию.



# КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОГО СИНДРОМА

- тяжелое общее состояние (высокая температура, головная боль, боль в мышцах и суставах, нарушение сознания — коллапс, коматозное состояние);
- бледность кожных покровов;
- на фоне бледности иктеричность лимонного цвета;
- одышка (гипоксия на фоне анемии);
- увеличение печени и селезенки;





# ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- нормохромная анемия;
- дегенеративные изменения эритроцитов — пойкило-, анизо-, шизоцитоз;
- гипергемоглобинемия (повышенное количество свободного гемоглобина);
- лейкоцитарная формула — нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево (иногда до промиелоцитов и миелобластов);
- гипербилирубинемия за счет непрямого билирубина;
- большое количество сывороточного железа;
- в дальнейшем — ретикулоцитоз;

## Анализ мочи:

- гемоглобинурия (гемоглобин в моче — дает черный цвет);
- стеркобилиноген, уробилиноген;

Анализ кала: увеличение стеркобилиногена.



# СИНДРОМ ДИССЕМНИРОВАННОГО ВНУТРИСОСУДИСТОГО СВЕРТЫВАНИЯ

- **ДВС - синдромом** называется динамический патологический процесс дезорганизации системы гемостаза, приводящий при спонтанном своем течении к тяжелому повреждению и гибели органов и тканей организма в результате либо необратимого тромбообразования и блокады микроциркуляторного русла, либо смертельного кровотечения.




# ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ДВС-СИНДРОМА У ДЕТЕЙ СЛЕДУЮЩИЕ:

- тяжёлые вирусные и бактериальные (особенно вызванные грамотрицательной и смешанной микрофлорой) инфекции;
- гипотермия;
- гипоксия/асфиксия;
- ацидоз;
- шок, острая гипотензия;
- травмы и деструктивные поражения органов (тяжёлый гемолиз, лейколиз, массивная травма, ожоги, деструкция паренхиматозных органов, некроз).
- В подавляющем большинстве случаев стартовый механизм ДВС-синдрома у новорождённых - сердечно-сосудистый коллапс или шок, с последующей активацией и повреждением сосудистого эндотелия, что приводит к повышению сосудистой экспрессии, выделению в кровь тканевого фактора, повышенных количеств интерлейкинов 1, 6 и 8, фактора активации тромбоцитов и фактора некроза опухолей.



# КЛИНИЧЕСКИ ВЫДЕЛЯЮТ ТРИ ФАЗЫ РАЗВИТИЯ ДВС-СИНДРОМА У ДЕТЕЙ:

- Первая - фаза гиперкоагуляции. В клинической картине доминируют симптомы основного заболевания, с присоединением признаков нарушения микроциркуляции: мраморность кожных покровов, дистальный цианоз, пятна стаза, гипотермия, умеренное увеличение размеров печени, селезёнки, тахикардия, снижение АД, тахипноэ, уменьшение диуреза.
- Вторая - фаза коагулопатии и тромбоцитопатии потребления. Возникают петехии и кровотечения из мест инъекций, бледность кожных покровов и слизистых оболочек, страдают функции жизненно важных органов в виде острой лёгочноциркуляторной и острой почечной недостаточности, отёка мозга, поражений миокарда. Одновременно возникают кровоизлияния, в том числе кровоизлияния в мозг; лёгочные и желудочно-кишечные кровотечения.
- Фаза восстановления. Если вторая фаза не приводит к летальному исходу, ДВС-синдром переходит в третью фазу - восстановления. Данная фаза сопровождается прекращением кровоточивости и постепенным восстановлением функций поражённых органов.



# ЛАБОРАТОРНЫЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ ДВС-СИНДРОМА

| ПОКАЗАТЕЛИ               | НОРМА           | 1-Я ФАЗА        | 2-Я ФАЗА       | 3-Я ФАЗА   |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| Тромбоэластограмма       |                 |                 |                |            |
| Р                        | 4-8 мин.        | 3-5 мин.        | 10-15 мин.     | 11-26 мин. |
| К                        | 2-3 мин.        | 2-5 мин.        | 5-18 мин.      | 19-30 мин. |
| Ма                       | 56-65 мм.       | 47-65 мм.       | 24-40 мм.      | 20 мм.     |
| Тромбоциты               | 200-204<br>тыс. | 200-450<br>тыс. | 18-120<br>тыс. | 62 тыс.    |
| Протромбиновый<br>индекс | 100%            | 80-100%         | 34-75%         | 3-52%      |
| Фибриноген               | 200-300<br>мг.  | 200-400<br>мг.  | 130-220<br>мг. | 50 и ниже  |

# ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

- Это клиническое проявление склонности организма к неоднократным кровотечениям и кровоизлияниям как под влиянием незначительного травмирования, так и самопроизвольно (спонтанно).
- Группа заболеваний, клиническим признаком которых является геморрагический синдром, называются геморрагические диатезы.





# КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ДИАТЕЗОВ

1. Коагулопатии - в основе патогенеза лежит нарушение свертывающей системы крови (гемофилия).
2. Тромбоцитопатии - заболевания обусловлены нарушением образования и состава тромбоцитов (болезнь Верльгофа).
3. Вазопатии - в основе патологии лежит поражение сосудистой стенки (болезнь Шенлейна-Геноха).

# ГЕМОФИЛИЯ

- это врожденное заболевание, в основе длительной кровоточивости которого лежит нарушение свертывающей системы крови.
- В патогенезе заболевания лежит нарушение первой фазы свертывания крови: наличие у больного антигемофильных факторов в количестве меньше нормы нарушает образование плазменного тромбопластина, что приводит к удлинению (=замедлению) времени свертывания крови, в результате чего происходит продолжительное кровотечение.




## ВЫДЕЛЯЮТ 3 ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ГЕМОФИЛИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО НЕДОСТАТКА ОДНОГО ИЗ АНТИГЕМОФИЛЬНЫХ ФАКТОРОВ:

- **гемофилия А** ( классическая) — дефицит VII фактора (антигемофильного глобулина А); наиболее частая форма — 80% от общего количества больных;
- **гемофилия В** — дефицит IX фактора (плазменного тромбопластинового компонента-фактора Кристмаса); частота — 10-15%;
- **гемофилия С** — снижение активности XI фактора (плазменного предшественника тромбопластина фактора Розенталя); частота 3-5%.

Таким образом, в основе гемофилии лежит нарушение механизма вторичного внутреннего гемостаза.

# КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

- кровотечения из остатка пуповины у новорожденного;
- кровотечения у детей грудного возраста при прорезывании зубов, у старших — при их удалении;
- кровотечения при незначительном травмировании кожи (стрижка, ушиб, царапины);
- кровотечения из слизистых оболочек носовых ходов, ротовой полости, желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей, что может привести к постгеморрагической анемии;
- гемартрозы, для которых характерны увеличение объема и болезненность суставов, могут сопровождаться гипертермией. Неоднократные гемартрозы, когда кровь полностью не рассасывается, приводят к деформации суставов, развитию контрактуры (ограничение движений в суставе), анкилоза (полная неподвижность в суставе) и инвалидности детей;
- синяки и гематомы — результат кровоизлияний в коже, подкожной клетчатке, мышечной ткани и в забрюшинном пространстве.



- Для течения гемофилии характерна периодичность — т.е. периоды обострения (возникают они совершенно неожиданно, могут быть даже на фоне терапевтической профилактики заболевания) сменяются разными по длительности периодами ремиссии (от нескольких недель до нескольких лет).
- Заболевание в детском возрасте часто приобретает тяжелую форму с высокой смертностью (до 75%). После 20 лет отмечается облегчение клинических признаков и более редкое возникновение обострений.


# ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛАБОРАТОРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ:

- 1) удлинение времени свертывания крови (по Ли-Уайту — от нескольких десятков минут до нескольких часов);
- 2) удлинение времени рекальцификации плазмы;
- 3) уменьшение в плазме антигемофильных факторов.

Анализы первичного гемостаза (количество тромбоцитов, показатель ретракции кровяного сгустка и ДРЛ и тромбиновое время у больных гемофилией в пределах нормы!)

# БОЛЕЗНЬ ВЕРЛЬГОФА (ИДИОПАТИЧЕСКАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКАЯ ПУРПУРА)

- Это заболевание, характеризующееся склонностью к кровоточивости, обусловленной тромбоцитопенией.
- По этиологии существует две формы заболевания:
  - 1) наследственная (очень редкая):
  - 2) приобретенная, которая по разным современным теориям разделена еще на 2 формы:
    - первичная :
      - нарушение костного мозга в виде замедленного созревания мегакариоцитов и отшнуровки тромбоцитов;
      - задержка тромбоцитов и их повышенный гемолиз в селезенке;
      - иммунная теория, согласно которой антитромбоцитарные аутоантитела как разрушают тромбоциты в крови, так и патологически влияют на процесс отшнуровки в костном мозге;
    - вторичная : возникновению тромбоцитопении способствуют вирусные инфекции, интоксикация разного генеза, эндокринные и психологические нарушения, лекарственные препараты (особенно прививки), пищевые и прочие факторы.



# КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

- возникающие на любой поверхности кожи и видимых слизистых оболочках геморрагии (кровоизлияния) имеют следующие характерные
- признаки:
- асимметричные:
- полиморфные — разных размеров (от петехии до экхимозов);
- полихромные (не одного цвета) — так как геморрагии возникают одна за другой в разное время, то одновременно их цвет в зависимости
- от длительности бывает от красно-бордового (свежие) до сине-зеленого и желтого (через несколько дней); кожа приобретает характерный вид — «кожа леопарда»;
- кровотечения:
- из слизистых оболочек носа, полости рта, мочевого пузыря, желудочно-кишечного тракта, легких, почек и др.;
- у старших девочек обильные маточные кровотечения;
- могут быть кровоизлияния в головной мозг, плевру, сетчатку глаз.



# ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛАБОРАТОРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ:

- 1) тромбоцитопения (может быть до нескольких единиц);
- 2) удлинение времени кровотечения по Дюке (10-20 мин. и больше);
- 3) удлинение или отсутствие ретракции кровяного сгустка;
- 4) нарушение показателей ААФТ;
- 5) положительные пробы на выявление резистентности капиллярной стенки;
- 6) при значительном кровотечении развивается постгеморрагическая анемия — уменьшение показателей эритроцитов и гемоглобина.



# БОЛЕЗНЬ ШЕНЛЕЙНА-ГЕНОХА (ГЕМОМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ)

- Это острое инфекционно-аллергическое заболевание, характеризующееся поражением сосудистой стенки мелких кровеносных сосудов с образованием микротромбов.

## Причины:

- Аллергическая настроенность
- Острое инфекционное заболевание
- Хронические очаги инфекции
- Реакция на прививку
- Наследственная предрасположенность




# КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

- У детей геморрагический васкулит наблюдается чаще, нежели у взрослых лиц.
- В зависимости от места поражения выделено 4 основных синдрома заболевания:

**1) Кожный синдром** — геморрагии на коже, для которых характерны:


- вид сыпи — чаще петехий (может быть пятнисто-папулезная сыпь);
- симметричность возникновения;
- место возникновения — чаще вокруг суставов, особенно голеностопных, на разгибательных поверхностях конечностей и ягодицах;
- одновременное возникновение всей сыпи и потому все геморрагии одного цвета (сначала красные, через несколько дней переходят в желтый цвет);
- часто для сыпи характерно волнообразное течение — через несколько дней, а иногда и через 2 недели после первой сыпи появляются новые элементы свежей геморрагии;



**2) Суставной синдром** нередко возникает одновременно с кожным синдромом, поэтому называется еще кожно-суставным — обычно поражаются голеностопные, коленные и лучезапястные суставы, в которых возникает боль, отечность и гиперемия кожи; процесс непродолжительный — 2-3 дня.

### 3) Абдоминальный синдром - напоминает клинику «острого живота»:

- приступообразная боль в брюшной полости — ребенок беспокойный, мечется; для боли не характерна локализация, а наоборот — миграция (т.е. меняется место ее расположения, как в виде жалобы, так и при пальпации);
- больной принимает вынужденное положение — прижимает ноги к животу или находится в коленно-локтевом положении;
- рвота, может быть с кровью;
- понос, тоже может быть с кровью;
- бледное, страдальческое выражение лица;
- СУХОЙ, обложенный белым налетом язык:




• **4) Почечный синдром**, возникает обычно на 2-4 неделе патологического процесса. В анализе мочи почечный синдром проявляется:

- гематурией (эритроциты в моче);
- протеинурией (белок в моче).

Иногда кровоизлияния в головном мозге приводят к:

- судорогам;
- общему менингеальному синдрому.

Процесс в целом чаще имеет благоприятный исход.




# ДИАГНОСТИКА

- Общий анализ крови: специфических изменений нет; умеренный лейкоцитоз с небольшим сдвигом влево и повышение СОЭ.
- Общий анализ мочи: гематурия, протеинурия.
- Анализ кала на скрытую кровь: положительный.
- Коагулограмма: без изменений.



# ЛЕЙКОЗ

- Это опухоль, возникающая из кроветворных клеток, с обязательным поражением костного мозга и вытеснением нормальных ростков кроветворения.
- Известно, что заболевание чаще возникает при:
  - - рентгенологическом облучении;
  - - ионизирующем излучении;
  - - продолжительном приеме цитостатических иммунодепрессантов;
  - - влиянии радиоактивных и некоторых химических веществ (бензол).



Исследователями замечена наследственная склонность к заболеванию.

# ВСЕ ЛЕЙКОЗЫ ДЕЛЯТСЯ НА 2 ГРУППЫ: ОСТРЫЕ И ХРОНИЧЕСКИЕ

- При остром лейкозе происходит патологическая пролиферация и задержка развития малодифференцированных, молодых, т.е. бластных клеток, которые и составляют основную массу опухолевых клеток.
- У детей острый лейкоз наблюдается чаще хронического.
- При хроническом лейкозе происходит повышенная пролиферация незрелых стадий и сохранение их дифференцирования до зрелых клеточных элементов. Основную массу опухолевых клеток составляют морфологически зрелые клетки (лимфоциты при лимфолейкозе, моноциты при моноцитарном лейкозе, эритроциты при эритремии и т.д.)

# КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

- Симптомы носят общий характер: слабость, быстрая утомляемость, недомогание, иногда одышка, тахикардия, головокружение (в связи с анемией), субфебрильная температура.
- Более характерными являются признаки, появляющиеся в острой стадии:
  - - боль в костях (чаще поражаются трубчатые кости, их диафизы, особенно бедренная и большеберцовая);
  - - боль в суставах (одновременно может быть припухлость тканей и покраснение кожи в области суставов);
  - - болезненность костей при поколачивании, что связано с инфильтрацией тканей лейкозными клетками;
  - - значительное диагностическое значение имеет симптом стернальгии — болезненность при постукивании грудины.



# КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

- А затем происходит стремительное разрастание симптоматики лейкоза:
  - высокая лихорадка;
  - обширная картина геморрагического синдрома;
  - язвенно-некротический процесс полости рта, зева, кишечника (в связи лейкозной инфильтрацией тканей и сосудов, последующим присоединением инфекции и снижением защитной функции организма);
  - все более выраженная анемия (бледность кожи и слизистых оболочек).

## При полном объективном осмотре выясняются следующие признаки и возможные осложнения тяжелого патологического процесса:

- увеличение лимфатических узлов, может быть так называемый симптомокомплекс Микулича;
- сердце: может быть миокардиодистрофия на фоне анемии, а также лейкозная инфильтрация, некрозы и кровоизлияния в сердечной мышце ; при этом перкуторно — границы расширены, аускультативно — тоны глухие, систолический шум; может развиваться перикардит;
- пульс — малый, тахикардия;
- АД резко снижено;
- легкие — пневмония с лейкозной инфильтрацией и очагами некроза;
- экссудативный плеврит;
- увеличение печени, селезенки разной степени, чаще в более поздней стадии патологического процесса; при пальпации плотные, безболезненные ;
- нервная система — признаки лейкозного менингоэнцефалита.




# ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Общий анализ крови:
  - эритропения (может быть до 1-1,5 Т/л);
  - снижение гемоглобина (даже до 20-30 г/л);
  - тромбоцитопения (бывает ниже критического уровня);
  - количество лейкоцитов может быть разным — от лейкопении (в начале заболевания) к значительному гиперлейкоцитозу (даже выше 100 Г/л);
  - основной состав лейкограммы — лейкозные властные клетки, число которых может достигать 100%;
  - **лейкемический провал!**
  - повышение СОЭ



# ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ГИСТОГРАММА ПРИ ЛЕЙКОЗАХ



- а) острый лейкоз;
- б) хронический миелобластный лейкоз;
- в) хронический лимфобластный лейкоз

# СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- А.М. Абезгауз Геморрагические заболевания у детей / А.М. Абезгауз. - М.: Медицина, 2015. - 326 с.
- В.П. Бисярина Железодефицитные анемии у детей раннего возраста / В.П. Бисярина, Л.М. Казакова. - М.: Медицина, 2012. - 176 с.
- А.А. Дроздов Заболевания крови. Полный справочник / А.А. Дроздов, М.В. Дроздова. - М.: Эксмо, 2015. - 608 с.
- А.В. Демидова Анемии / А.В. Демидова. - М.: МЕДпресс-информ, 2016. - 507 с.
- А.Э. Ермолин Дифференциальная диагностика и лечение острых и хронических лейкозов / А.Э. Ермолин. - М.: Бином, 2015. - 202 с.
- А.Г. Румянцев Гемофилия в практике врачей различных специальностей / А.Г. Румянцев, С.А. Румянцев, В.М. Чернов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 136 с.
- А.Н. Мамаев Коагулопатии / А.Н. Мамаев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 268 с.
- А.Ф. Тур Гематология детского возраста / А.Ф. Тур. - М.: Государственное издательство медицинской литературы, 2015. - 310 с.
- Вопросы гематологии в педиатрии. Работы кафедры госпитальной педиатрии. - М.: Ленинградский педиатрический медицинский институт, 2016. - 303 с.