

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Математика и суперкомпьютерное моделирование»

Курсовая работа

по дисциплине «Численные и аналитические методы оптимизации»
на тему «Простейшая вариационная задача с подвижными границами»

Направление подготовки – 01.03.01 Математика

Профиль подготовки – Вычислительная математика и компьютерные науки

Выполнил студент: _____ Симакова Е.А.

Группа: _____ 19BM1

Руководитель:

к. ф.-м. н., доцент _____ Москалева М.А.

Работа защищена с оценкой _____

Преподаватель _____

Дата защиты _____

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедрой МСМ

_____ Смирнов Ю.Г.

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине

«Численные и аналитические методы оптимизации»

Тема: «Простейшая вариационная задача с подвижными границами»

- а) Изучить литературу по теме курсовой работы.
- б) Изложить реферативно изученный по теме теоретический материал.
- в) Самостоятельно придумать и решить задачи по теме курсовой работы.

Руководитель работы, доцент

Москалева М.А.

Оглавление

Введение	4
Глава I. Теоретическая часть	6
§1. Простейшая задача с подвижными границами.....	6
Глава II. Практическая часть	13
Заключение.....	19
Список литературы	20

Введение

Наряду с задачами, в которых необходимо определить максимальные и минимальные значения некоторой функции $z = f(x)$, в задачах физики нередко возникает необходимость найти максимальные или минимальные значения величин особого рода, называемых функционалами.

Функционалами называются переменные величины, значения которых определяются выбором одной или нескольких функций. Например, функционалами являются: длина дуги плоской кривой, площадь некоторой поверхности, моменты инерции, статистические моменты, координаты центра тяжести, так как их значения определяются выбором кривой или поверхности, т. е. выбором функций, входящих в уравнение этой кривой или поверхности.

Вариационное исчисление изучает методы, позволяющие находить максимальные и минимальные значения функционалов. Задачи, в которых требуется исследовать функционал на максимум или минимум, называются *вариационными задачами*.

Многие законы механики и физики сводятся к утверждению, что некоторый функционал в рассматриваемом процессе должен достигать минимума или максимума. В такой формулировке эти законы носят название вариационных принципов механики или физики. К числу таких вариационных принципов или простейших следствий из них принадлежат: принцип наименьшего действия, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения момента количества движения и т. д.

Вариационное исчисление начало развиваться с 1696 года и оформилось в самостоятельную математическую дисциплину с собственными методами исследования после фундаментальных работ действительного члена Петербургской Академии наук Л. Эйлера (1707 – 1783 г.), которого с полным основанием можно считать создателем вариационного исчисления.

Большое влияние на развитие вариационного исчисления оказали три задачи: задача о брахистохроне, задача о геодезических линиях, изопериметрическая задача.

В теоретической части курсовой работы будет рассматриваться простейшая задача с подвижными границами.

В практической части курсовой работы будет рассматриваться решение задач по данной теории.

Глава I. Теоретическая часть

§1. Простейшая задача с подвижными границами

При исследовании функционала

$$v = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y, y') dx$$

предполагалось, что граничные точки (x_0, y_0) и (x_1, y_1) заданы. Предположим теперь, что одна или обе граничные точки могут перемещаться. Тогда класс допустимых кривых расширяется, – кроме кривых сравнения, имеющих общие граничные точки с исследуемой кривой, можно уже брать и кривые со смещенными граничными точками.

Поэтому если на какой-нибудь кривой $y = y(x)$ достигается экстремум в задаче с подвижными граничными точками, то экстремум тем более достигается по отношению к более узкому классу кривых, имеющих общие граничные точки с кривой $y = y(x)$, и, следовательно, должно быть выполнено основное, необходимое для достижения экстремума в задаче с неподвижными границами условие – функция $y(x)$ должна быть решением уравнения Эйлера

$$F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} = 0.$$

Итак, кривые $y = y(x)$, на которых реализуется экстремум в задаче с подвижными границами, должны быть экстремалами.

Общее решение уравнения Эйлера содержит две произвольные постоянные, для определения которых необходимо иметь два условия. В задаче с неподвижными граничными точками такими условиями были

$$y(x_0) = y_0 \text{ и } y(x_1) = y_1.$$

В задаче с подвижными границами одно или оба эти условия отсутствуют и недостающие условия для определения произвольных постоянных общего решения уравнения Эйлера должны быть получены из основного необходимого условия экстремума – равенства нулю вариации δv .

Так как в задаче с подвижными границами экстремум достигается лишь на решениях $y = y(x, C_1, C_2)$ уравнения Эйлера, то в дальнейшем можно рассматривать значение функционала лишь на функциях этого семейства. При этом функционал $v[y(x, C_1, C_2)]$ превращается в функцию параметров C_1 и C_2 и пределов интегриции x_0 и x_1 , а вариация функционала совпадает с дифференциалом этой функции.

Для упрощения будем считать, что одна из граничных точек, например (x_0, y_0) , закреплена, а другая (x_1, y_1) может перемещаться и переходит в точку $(x_1 + \Delta x_1, y_1 + \Delta y_1)$, или, как обычно обозначают в вариационном исчислении, $(x_1 + \delta x_1, y_1 + \delta y_1)$.

Допустимые кривые $y = y(x)$ и $y = y(x) + \delta y$ будем считать близкими, если модули вариаций δy и $\delta y'$ малы, и малы модули приращений δx_1 и δy_1 (приращения δx_1 и δy_1 обычно называют вариациями предельных значений x_1 и y_1).

Экстремали, проходящие через точку (x_0, y_0) , образуют пучок экстремалей $y = y(x, C_1)$. Функционал $v[y(x, C_1)]$ на кривых этого пучка превращается в функцию C_1 и x_1 . Если кривые пучка $y = y(x, C_1)$ в окрестности рассматриваемой экстремали не пересекаются, то $v[y(x, C_1)]$ можно рассматривать как однозначную функцию x_1 и y_1 , так как задание x_1 и y_1 определяет экстремаль пучка (рис. 1) и тем самым определяет значение функционала.




рис. 1

Вычислим вариацию функционала $v[y(x, C_1)]$ на экстремалиях пучка $y = y(x, C_1)$ при перемещении граничной точки из положения (x_1, y_1) в положение $(x_1 + \delta x_1, y_1 + \delta y_1)$. Так как функционал v на кривых пучка превратился в функцию x_1 и y_1 , то его вариация совпадает с дифференциалом этой функции. Выделим из приращения Δv главную линейную по отношению к δx_1 и δy_1 часть:

$$\begin{aligned} \Delta v &= \int_{x_0}^{x_1 + \delta x_1} F(x, y + \delta y, y' + \delta y') dx - \int_{x_0}^{x_1} F(x, y, y') dx = \\ &= \int_{x_1}^{x_1 + \delta x_1} F(x, y + \delta y, y' + \delta y') dx + \\ &+ \int_{x_0}^{x_1} [F(x, y + \delta y, y' + \delta y') - F(x, y, y')] dx. \end{aligned} \quad (1)$$

Первое слагаемое правой части преобразуем с помощью теоремы о среднем значении:

$$\int_{x_1}^{x_1 + \delta x_1} F(x, y + \delta y, y' + \delta y') dx = F|_{x=x_1 + \theta \delta x_1} \delta x_1, \quad \text{где } 0 < \theta < 1,$$

в силу непрерывности функции F будем иметь:

$$F|_{x=x_1 + \theta \delta x_1} = F(x, y, y')|_{x=x_1} + \varepsilon_1,$$

где $\varepsilon_1 \rightarrow 0$ при $\delta x_1 \rightarrow 0$ и $\delta y_1 \rightarrow 0$.

Итак,

$$\int_{x_1}^{x_1 + \delta x_1} F(x, y + \delta y, y' + \delta y') dx = F(x, y, y')|_{x=x_1} \delta x_1 + \varepsilon_1 \delta x_1.$$

Второе слагаемое правой части (1) преобразуем путем разложения подынтегральной функции по формуле Тейлора

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} [F(x, y + \delta y, y' + \delta y') - F(x, y, y')] dx = \\ = \int_{x_0}^{x_1} [F_y(x, y, y')\delta y + F_{y'}(x, y, y')\delta y'] dx + R_1, \end{aligned}$$

где R_1 является бесконечно малой более высокого порядка, чем δy или $\delta y'$. В свою очередь линейная часть

$$\int_{x_0}^{x_1} (F_y\delta y + F_{y'}\delta y') dx$$

может быть преобразована путем интегрирования по частям второго слагаемого подынтегральной функции к виду

$$[F_{y'}\delta y]_{x_0}^{x_1} + \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} \right) \delta y dx.$$

Значения функционала берутся лишь на экстремалих, следовательно, $F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} \equiv 0$. Так как граничная точка (x_0, y_0) закреплена, то $\delta y|_{x=x_0} = 0$. Следовательно,

$$\int_{x_0}^{x_1} (F_y\delta y + F_{y'}\delta y') dx = [F_{y'}\delta y]_{x=x_1}.$$

Заметим, что $\delta y|_{x=x_1}$ не равно δy_1 – приращению y_1 , так как δy_1 – это приращение y_1 при перемещении граничной точки в положение $(x_1 + \delta x_1, y_1 + \delta y_1)$, а $\delta y|_{x=x_1}$ – это приращение ординаты в точке x_1 при переходе от экстремали, проходящей через точки (x_0, y_0) и (x_1, y_1) к экстремали, проходящей через точки (x_0, y_0) и $(x_1 + \delta x_1, y_1 + \delta y_1)$ (рис. 2).




рис. 2

Из чертежа видно, что $BD = \delta y|_{x=x_1}$; $FC = \delta y_1$; $EC \approx y(x_1)\delta x_1$; $BD = FC - EC$

или

$$\delta y|_{x=x_1} \approx \delta y_1 - y'(x_1)\delta x_1.$$

При этом приближенное равенство справедливо с точностью до бесконечно малых более высокого порядка.

Итак, окончательно имеем:

$$\int_{x_0}^{x_1 + \delta x_1} F dx \approx F|_{x=x_1} \delta x_1;$$

$$\int_{x_0}^{x_1} [F(x, y + \delta y, y' + \delta y') - F(x, y, y')] dx \approx F_{y'}|_{x=x_1} \cdot (\delta y_1 - y'(x_1)\delta x_1),$$

где приближенные равенства также справедливы с точностью до членов порядка выше первого относительно δx_1 и δy_1 .

Следовательно, из (1) получим

$$\begin{aligned}\delta v &= F|_{x=x_1} \delta x_1 + F_{y'}|_{x=x_1} \cdot (\delta y_1 - y'(x_1) \delta x_1) \\ &= (F - y' F_{y'})|_{x=x_1} \delta x_1 + F_{y'}|_{x=x_1} \delta y_1\end{aligned}$$

или

$$\delta \bar{v}(x_1, y_1) = (F - y' F_{y'})|_{x=x_1} \delta x_1 + F_{y'}|_{x=x_1} \delta y_1,$$

где $\bar{v}(x_1, y_1)$ – функция, в которую превратился функционал v на экстремальных $y = y(x, C_1)$, а $dx_1 = \Delta x_1 = \delta x_1$, $dy_1 = \Delta y_1 = \delta y_1$ – приращения координат граничной точки.

Основное необходимое условие экстремума $\delta v = 0$ приобретает вид

$$(F - y' F_{y'})|_{x=x_1} \delta x_1 + F_{y'}|_{x=x_1} \delta y_1 = 0. \quad (2)$$

Если вариации δx_1 и δy_1 независимы, то отсюда следует, что

$$(F - y' F_{y'})|_{x=x_1} = 0 \text{ и } F_{y'}|_{x=x_1} = 0.$$

Однако чаще приходится рассматривать случай, когда вариации δx_1 и δy_1 зависимы.

Пусть, например, правая граничная точка (x_1, y_1) может перемещаться по некоторой кривой

$$y_1 = \varphi(x_1).$$

Тогда $\delta y_1 \approx \varphi'(x_1) \delta x_1$ и, следовательно, условие (2) принимает вид $[F + (\varphi' - y') F_{y'}] \delta x_1 = 0$ или, так как δx_1 изменяется произвольно, то $[F + (\varphi' - y') F_{y'}]|_{x=x_1} = 0$. Это условие устанавливает зависимость между угловыми коэффициентами φ' и y' в граничной точке. Оно называется *условием трансверсальности*.

Условие трансверсальности совместно с условием $y_1 = \varphi(x_1)$ позволяет, вообще говоря, определить одну или несколько экстремалей пучка $y = y(x, C_1)$, на которых может достигаться экстремум. Если граничная точка (x_0, y_0) может перемещаться по некоторой кривой $y_0 = \psi(x_0)$, то

совершенно так же обнаружим, что и в точке (x_0, y_0) должно удовлетворяться условие трансверсальности

$$[F + (\psi' - y')F_{y'}] \Big|_{x=x_0} = 0.$$

Глава II. Практическая часть

Задание №1

Найти условие трансверсальности для функционалов вида:

$$v = \int_{x_0}^{x_1} A(x, y) \sqrt{1 + y'^2} dx.$$

Решение:

Условие трансверсальности $F + (\varphi' - y')F_{y'} = 0$ имеет в данном случае вид:

$$A(x, y) \sqrt{1 + y'^2} + (\varphi' - y') \cdot \frac{A(x, y) \cdot y'}{\sqrt{1 + y'^2}} = 0$$

или

$$\frac{A(x, y)(1 + \varphi' y')}{\sqrt{1 + y'^2}} = 0;$$

предполагая, что $A(x, y) \neq 0$ в граничной точке, получим $1 + \varphi' y' = 0$ или $y' = -\frac{1}{\varphi'}$, т.е. условие трансверсальности свелось в данном случае к условию ортогональности.

Задание №2

Исследовать на экстремум функционал

$$v = \int_0^{x_1} \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{y} dx,$$

причем $y(0) = 0$, а $y_1 = x_1 - 5$ (рис. 3).




рис. 3

Решение:

Интегральными кривыми уравнения Эйлера являются окружности $(x - C_1)^2 + y^2 = C_2^2$. Первое граничное условие дает $C_1 = C_2$. Так как условие трансверсальности для данного функционала сводится к условию ортогональности, то прямая $y_1 = x_1 - 5$ должна быть диаметром окружности и, следовательно, центр искомой окружности находится в точке $(5, 0)$ пересечения прямой $y_1 = x_1 - 5$ с осью абсцисс. Следовательно, $(x - 5)^2 + y^2 = 25$, или $y = \pm\sqrt{10x - x^2}$. Итак, экстремум может достигаться лишь на дугах окружности $y = \sqrt{10x - x^2}$ и $y = -\sqrt{10x - x^2}$.

Если граничная точка (x_1, y_1) может перемещаться лишь по вертикальной прямой (рис. 4) и, следовательно, $\delta x_1 = 0$, то условие (2) переходит в $F_{y'}|_{x=x_1} = 0$.




рис. 4

Пусть, например, в задаче о брахистохроне левая граничная точка закреплена, а правая может перемещаться по вертикальной прямой.

Экстремальми функционала $v = \int_0^{x_1} \frac{\sqrt{1+y'^2}}{\sqrt{y}} dx$ являются циклоиды, уравнения которых, если принять во внимание условие $y(0) = 0$, будут иметь вид

$$x = C_1(t - \sin t),$$

$$y = C_1(1 - \cos t).$$

Для определения C_1 используем условие $F_{y'}|_{x=x_1} = 0$, которое в данном случае имеет вид

$$\frac{y'}{\sqrt{y}\sqrt{1+y'^2}} \bigg|_{x=x_1} = 0,$$

откуда $y'(x_1) = 0$.

То есть искомая циклоида должна пересекать прямую $x = x_1$ под прямым углом и, следовательно, точка $x = x_1$, $y = y_1$ должна быть вершиной циклоиды (рис. 5).




рис. 5

Так как вершине соответствует значение $t = \pi$, то $x_1 = C_1\pi$, $C_1 = \frac{x_1}{\pi}$.

Следовательно, экстремум может реализовываться лишь на циклоиде

$$x = \frac{x_1}{\pi}(t - \sin t),$$

$$y = \frac{x_1}{\pi}(1 - \cos t).$$

Если граничная точка (x_1, y_1) в задаче об экстремуме функционала

$$v = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y, y') dx$$

может перемещаться по горизонтальной прямой $y = y_1$, то $\delta y_1 = 0$ и условие (2), или условие трансверсальности, принимает вид

$$(F - y'F_{y'})|_{x=x_1} = 0.$$

Задание №3

Найти расстояние между параболой $y = x^2$ и прямой $y = x - 5$.

Решение:

Задача сводится к нахождению экстремального значения интеграла

$$v = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + y'^2} dx.$$

при условии, что левый конец экстремали может перемещаться по кривой $y = x^2$, а правый – по прямой $y = x - 5$. Таким образом, в нашем случае имеем $\varphi(x) = x^2$, $\psi(x) = x - 5$. Общее решение уравнения Эйлера будет: $y = C_1x + C_2$, C_1 и C_2 – произвольные постоянные, которые предстоит определить.

Условия трансверсальности имеют вид:

$$\left[\sqrt{1 + y'^2} + (2x - y') \frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}} \right]_{x=x_0} = 0,$$
$$\left[\sqrt{1 + y'^2} + (1 - y') \frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}} \right]_{x=x_1} = 0,$$

где $y' = C_1$. Уравнения принимают вид

$$\begin{cases} C_1x_0 + C_2 = x_0^2, \\ C_1x_1 + C_2 = x_1 - 5. \end{cases}$$

Итак, имеем системы четырех уравнений относительно четырех неизвестных C_1, C_2, x_0, x_1 :

$$\begin{cases} \sqrt{1 + C_1^2} + (2x_0 - C_1) \frac{C_1}{\sqrt{1 + C_1^2}} = 0, \\ \sqrt{1 + C_1^2} + (1 - C_1) \frac{C_1}{\sqrt{1 + C_1^2}} = 0, \\ C_1x_0 + C_2 = x_0^2, \\ C_1x_1 + C_2 = x_1 - 5. \end{cases}$$

Решая данную систему, получим, что:

$$C_1 = -1, C_2 = \frac{3}{4}, x_0 = \frac{1}{2}, x_1 = \frac{23}{8}.$$

Значит, уравнение экстремали есть $y = -x + \frac{3}{4}$ и расстояние между заданными параболой и прямой равно

$$l = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{23}{8}} \sqrt{1 + (-1)^2} dx = \sqrt{2}x = \frac{19\sqrt{2}}{8}.$$

Заключение

В теоретической части курсовой работы была рассмотрена простейшая задача с подвижными границами.

В практической части курсовой работы были рассмотрены задачи по данной теории.

Вариационное исчисление – это раздел анализа, в котором изучаются вариации функционалов. Наиболее типичная задача – найти функцию, на которой заданный функционал достигает экстремального значения.

Методы вариационного исчисления широко применяются в различных областях математики. Например, в дифференциальной геометрии с их помощью ищут геодезические линии и минимальные поверхности. В физике вариационный метод – один из мощнейших инструментов получения уравнений движения, как для дискретных, так и для распределённых систем, в том числе и для физических полей. Методы вариационного исчисления также применимы и в статике.

Список используемой литературы

1. Эльсгольц, Л. Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969 г. – 424 с.
2. Ванько, В. И. Вариационное исчисление и оптимальное уравнение: Учеб. для вузов / В. И. Ванько, О. В. Ермошина, Г. Н. Кувыркин. – 3-е изд., исправл. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006 г. – 488 с.
3. Краснов М. Л. Вариационное исчисление (Задачи и упражнения) / М. Л. Краснов, Г. И. Макаренко, А. И. Киселев. – М.: Наука, 1984 г. – 191 с.